

Verein für Pilzkunde



Laufental - Thierstein

# Fundstatistik der

PILZE AUF

2021

# Rückblick auf die Pilzsaison 2021

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und somit auch die Pilzsaison der Speisepilzsammler. Wer glaubte, dieses Jahr könnte sich zu einem erfolgreichen Pilzjahr entwickeln, hatte sich getäuscht. Die abwechslungsreichen Perioden zwischen Regen und Sonnenschein waren für die Pilze schlussendlich zu viel. Die anschliessende Biesenlage verhinderte nach meiner Meinung eine tolle Herbstpilzsaison. Man kann das Resultat an der Statistik der Pilzkontrollen sehen, wenig Kontrollen und bei den Kontrollen kleine Mengen. Auffallend war der fast ganze Ausfall der Familie der Röhrlinge. Ein solcher Ausfall verhindert oft die Lust am Speise-Pilze sammeln. Kompensiert wurde jedoch dieser Ausfall durch die guten Funde der Pfifferlinge. Die Statistik füllenden Arten wie Nebelkappen, Hallimasch und Mönchsköpfe erschienen fast alle erst sehr spät. Wer sich dennoch auf die Socken machte, hatte meistens Glück bei den Blutreizkern. Der Vorteil dabei war wenig Giftpilze in den Kontrollen, denn auch diese erschienen nicht oder nur spärlich. Die Artenvielfalt ist in meiner Statistik ziemlich gleich geblieben. Einige Arten blieben aus, weniger bekannte Arten hatten bessere Chancen. Dies gilt auch bei den Standorten, hier musste man neue suchen. Ein weiteres Kapitel sind die Gattungsnamen. Seit einiger Zeit existiert eine Weltliste, die die bestehenden Gattungen neu aufteilt oder definiert. Wer Interesse der neuen Namen hat, kann sich bei *Swissfungi Verbreitungsatlas* informieren. Diese, meine Feststellungen beziehen sich auf meine Beobachtungen in unserem Floristik Gebiet.

*Paxillus*

JKM

# Weiher in der Ermitage, Arlesheim



# *Clavulina velutipes* Samtfussrübling

Standort: An Laubholz, Winterhalbjahr.  
Fruchtkörper: bis 60 mm. Stiel samtig.  
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, hyalin. Mit Pielo- und  
Caulozystiden.  
Foto: Esther Indra



## Lentinellus ursinus Filziger Zähling

Hut 2-5 cm, halbkreisförmig, stiellos, oft mehrere Hüte dachziegelig übereinander. Oberfläche striegelig-filzig, gelbbraun, Rand glatter. L. blass, fächerförmig. Sp 3-4 x 2-3 µm, fein warzig. Laub-, insbesonders Buchenholz; wärmeliebend. Nach Lit. sehr selten.



## *Hygrophorus arbustivus* Mehlstielschneckling

Kleiner und weniger fleischig als *H. nemoreus*. Hut 6-8 cm, Oberfläche eingewachsen faserig, orangebraun bis blass rosagrau mit blasserem, dünnem Rand. Ohne Mehlgeruch. Sp. 7-9 x 5-5,5 µm. Unter Laubbäumen, besonders bei Buchen, Hainbuchen und Eichen. Spät im Jahr. Foto: Theo Bischof.



## Mycena polygramma Rillstieliger Helmling

Hut bis 5 cm, konvex, bereift, graulich. Lamellen mit anastomosen. Stiel 5-12 x 0,5 cm, längsrillig oder nicht. Fleisch blass, geruchlos. Sp. 8-10 x 6-7 µm. Cheilozystiden schlank, fingerig. Vereinzelt oder in kleinen Büscheln auf oder neben alten Stümpfen. Weit verbreitet. Es gibt noch eine klein Form.



# Panellus serotinus

## Gelbstieliger Muschelseitling

Hut 6-15 cm, Oberfläche ± filzig, grünlich bis gelb- oder bronzabraun, zur Mitte hin meist dunkler. Lamellen gelb bis orange. Stiel lateral, wenn vorhanden, nur kurz, 1-3 x 1-2 cm, striegelig-filzig oder braunschuppig gefleckt auf grüngelbem Grund. Myzel orange. Fleisch blass, geruchlos, mild. Sp. schmal, 4 x 1,5 µm. Vorkommen auf Laubholz, gerne an Buchen; selten an Nadelholz. Wird mit Pleurotus ostreatus verwechselt.



## *Schizophyllum commune* Spaltblättling

Frkp. fächer- oder muschelförmig, 2-5 cm breit. Oberfläche zottig-filzig, weißgrau bis stumpfockerbeige. Rand oft eingerissen und oder gelappt. Das Hymenophor überzieht auf der Hutunterseite radiale, fleischbräunliche bis ockerrötliche Pseudolamellen. Fleisch blass, zäh. Sp 3-5 x 1-2 µm, zylindrisch. Vorkommen an totem Holz, vor allem an trockenen Standorten mit viel Lichteinfall.




# Cerrena unicolor Aschgrauer Wirrling

An Laubholz. Hutoberseite haarig-filzig (unteres Bild). Hyphenzellen labyrinthisch-porig oder in Zähnchen aufgelöst. Sp. 5,5-7 x 3-3,5 µm. Hyphensystem drimitisch, Septen mit Schnallen.



## *Chondrostereum purpureum* Violetter Schichtpilz

Rundliche bis flächige, jung schön violette bis purpurbraune, alt schokoladenbraune Krusten, die an senkrechtem Substrat kleine, lederig zähe, wellig verbogene Hütchen mit weißlicher bis graulicher, zottig-filziger Oberfläche ausbilden. Sp ± zylindrisch; 5-9 x 4 µm; inamyloid. Zystiden blasig. Vorkommen an lebendem und totem Laub-, seltener auch an Nadelholz.



## Inonotus radiatus Erlen Schillerporling

Frkp 5-10 cm, halbkreis- bis konsolenförmig; Oberfläche radialrunzelig, feinsamtig, rostbraun, alt schwärzend, Rand frischer Frkp. schön gelborange. Poren klein, unterhalb einer grauen Reifschicht lebhaft rotbraun, frisch mit Guttationstropfen. Fleisch satt orangebraun, feinfaserig, konzentrisch gezont. Sp. 5-6 x 4 µm. Spp. gelblich. An Erlenstümpfen und abgestorbenen Stämmen.



# *Meruliopsis corium* Gemeiner Lederfältling

Fruchtkörper 3-12 (30) cm, weißlich, im Alter gelblich, bis orange, lederartig-gummiartig, leicht ablösbar vom Substrat, Oberfläche feinfilzig, uneben, gewölbt, bandartige Hukanten. Fleisch weißlich, gummiartig, bei Trockenheit aufgerissen. Ohne Stiel, flach auf dem Substrat aufliegend. Sporen pulverfarbe weißlich, transparent. Sp. 5-6 x 2,5-3,5 µm. Vorkommen meist an Laubholz, an horizontal liegenden Ästen, Zweigen oder Stämmen, Fruchtkörperbildung beginnt meist im unteren Astbereich und wächst sich dann nach oben, Folgezersetzer, Weißfäuleauslöser. Herbst bis Frühling.



# *Schizophora paradoxa* Veränderlicher Spaltporling

Fruchtkörper 2-20 (40) cm Ø, weiß, schmutzig weiß, gelblich, cremefarben, beigebrun, +/- auch etwas rosabraun, flach aufsitzend, schiefl stehende zahnartige Ränder, am Grunde wabenartig verbunden. Fleisch weißlich, ockerlich, fest, zäh. Poren/Röhren weiß, cremefarben, spindelförmige Zähne, oft labyrinth-förmige Poren bildend, am Rand eingeschnitten, gesägt. Sporenpulverfarbe weiß, 4,5-6 x 2,5-4 µm, inamyloid, hyalin, Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen mit Schnallen. Mit vereinzelt kopfigen Terminalzellen.

Vorkommen:

An Laubholz, gern Eiche, Buche, Folgezersetzer, Weißfäuleauslöser, meist senkrecht am Totholz wachsend, ganzjährig.



## Lachnellula subtilissima Tannen-Nadelholzhaarbecherchen

Fruchtkörper 1-7 (9) mm Ø, becherförmig mit gelber bis orangerötlicher Fruchtschicht. Unterseite und äußerer Rand weißlich behaart. Bei Trockenheit rollen sich die Becherchen zusammen und sehen dann aus wie wollige Kugelchen. Fleisch weißlich bis hellgelb. Stiel hellgelb, kurz und auf dem Substrat aufsitzend. Sporen pulverfarbe transparent. Sp. 5-10 x 1,7 µm, achtsporig, Haare hyalin, dickwandig.



# *Irpelex lacteus* Milchweisser Eggenpilz

Fruchtkörper 3-50 cm, weiß, weiß-rötlich, milchweiß, gelblich, blasscrème, gelbbraun, gezahnt, flach auf dem Substrat aufliegend lederartig, konzentrisch gefurcht, auch zottig, resupinat aufliegend, bisweilen mit grünlichem Algenbelag. Fleisch weißlich. Stiel flach am Substrat angewachsen, teils mit Hütchenbildung. Röhren, Poren, Stacheln. Sp. 5-7 x 2,5-3 µm. Skeletthypfen inkrustiert. Septen ohne Schnallen. Vorkommen an Laubholz, seltener Nadelholz, Buche, Birke, Erle, Douglasie, parasitär oder folgezersetzend, ganzjährig, häufiger im Spätherbst bis Winter.



# Schneeglöckchen im Januar



*Polyporus varius*  
Löwengelber Porling

An Laubholz. Hut 10 bis 50 mm. Stielbasis schwarz. Sp.  
9-11 x 3,5-4 µm. Das ganze Jahr.



# *Sarcoscypha coccinea*

## Zinnoberroter Prachtsbecherling

An Laubholz. Februar bis Mai. Ein Schlauchpilz, den man von Februar bis Mai in schluchtartigen, feuchten Wäldern finden kann. Dieser Prachtsbecherling wird bis 50 mm gross. Es werden noch 2 weitere Formen mit anderen Sporenmassen beschrieben.



## Tubaria hiemale Winter-Trompetenschnitzling

In Wäldern und Gärten, auf pflanzlichen Resten, Holz. Winter. Fruchtkörper bis 40 mm groß. Mikromerkmale: Sporen 8 x 4,5 µm, braun. Cheilozystiden zylindrisch, mit erweitertem Kopfteil. HDS kutikular mit Schnallen.

Bemerkungen: Im Formenkreis der Tubarien mit Sporengroße ab 8 µm gibt es *T. conspersa*, mit auffallend behangenem Hutrand und *T. furfuracea*, eine Sommer-Herbst-Form ohne Cheilozystiden.



## Zylindrobasidion evolvens Ablösender Rindenpilz

An berindetem und unberindetem Laubholz. Hyphensystem monomitisch. Septen mit Schnallen. Sporen 8-12 x 5-6 µm, oft in kleinen Gruppen verklebt. Mit spindelförmigen Leptozystiden, bis 70 µm lang.



# Trametes hirsuta Striegelige Tramete

An Laubbäumen. Das ganze Jahr. Fruchtkörper: bis 60 mm groß, Oberfläche haarig  
Mikromerkale: Sporen 7,5 x 62,5 µm, hyalin. Hyphensystem trimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen

Bemerkungen: Mikroskopisch ist *T. hirsuta* identisch mit *T. versicolor*. Der wichtigste Unterschied ist die striegelig-filzige Hutoberfläche. *T. versicolor* hat nur eine samtige Hutoberfläche und eine schwarze Linie unterhalb der Hutdeckschicht (Lupe).



# *Coriolopsis gallica* Braune Tramete

Hauptsächlich bei Esche. Einzelhüte bis über 100 mm, oft zusammengewachsen. Oberseite stark striegelig-filzig. Poren rundlich 1-3 pro mm. Hyphensystem trimitisch, generative Hyphen mit Schnallen. Sp. 10-15 x 4,5-5,5 µm. Bei uns teilweise häufig.



# *Trametes versicolor* Schmetterlings-Tramete

An Holz von Laubbäumen. Ganzes Jahr.  
Fruchtkörper: bis 70 mm groß. Mikromerkale: Sporen 7 x 2 µm, hyalin. Hyphensystem trimisch. Generative Hyphen mit Schnallen.  
Bemerkungen: In der Farbe variabel. Die Oberfläche des Hutes ist samtig. Gegenüber *T. multicolor*, ist die Anwuchsstelle dünn. Unterhalb der HDS befindet sich eine schwarze Linie.



# *Fomes fomentarius*

## Zunderschwamm

An Laubholz, bei uns bei Buche oder Birke. Ein Porling, den man gut an den weissen Poren mündungen (Lupe oder Foto) bestimmen kann.



## *Auricularia auricula-judae* Judasohr

An Laubholz, Holunder, Ahorn. Das ganze Jahr. Fruchtkörper: bis 80 mm. Mikromerkmale: Sporen 18 x 7 µm, hyalin, mit Tropfen, allantoid. Basidien querseptiert. Haare auf der Hutoberfläche vorhanden. Bemerkungen: Die Fruchtkörper sind weich, gallertig, vom Substrat abstehend, fast stiellos am Substrat angewachsen. Die Fruchtschicht ist aderig. Er gehört in die Ordnung Heterobasidiomycetes.



## *Pycnoporellus fulgens* Leuchtender Weichporling

Hut: 3-8 (12) cm Ø, leuchtend orangerot, orangegelb, rotorange, jung kugelig, später flach, konsolenförmig, gezont, jung glatt, später filzig, weich, Rand heller, Zuwachszone orange bis gelb. Fleisch: Gelblich, orangerot, zäh, jung weich, saftig. Stiel: Fehlend, am Substrat flach angewachsen. Röhren, Poren: 1-3 mm Ø, gelblich, orangegelb, am Rand oft heller, rundlich eckig bis teils zerschlitzt. Sporenpulverfarbe Weiß (6-9,4 x 2,5-4,4 µm, hyaline in KOH, inamyloid, hyalin, zylindrisch bis lang ellipsoid, glatt, relativ dickwandig, Zystiden 45-60 x 4-6 µm, Septen ohne Schnallen. Totholz, Bauholz, meist Nadelholz, gern Weißtanne, Folgezersetzer, Braunfäuleauslöser, Sommer bis Spätherbst. Fleisch mit KOH (Kaliumhydroxid) weinrot verfärbend.



# *Coprinus micaceus* Glimmertintling

Bei Strünken von Laubholz. Frühjahr bis Herbst. Fruchtkörper: bis 30 mm groß.  
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4,5 µm, mit Keimporus, etwas mitraförmig, braun-schwarz..  
Bemerkungen: Die Velumresten bestehen aus kleinen, flockigen Schüppchen. Der Inhalt dieser Schüppchen besteht aus kettenartig angeordneten, rundlichen Zellen. *C. bisporus* ist sehr ähnlich, hat aber nur zwei Sterigmen. Ähnlich ist auch *C. silvaticus* ohne Velum, jedoch mit warzigen Sporen.



# Ermitage Arlesheim, Äquadukt mit Dom



# *Morchella elata*

## Spitzmorchel

Diese Morcheln wurden im Häcksel eines Gartens gefunden. Der Hut geht mehr oder weniger direkt in den Stiel über. Die Sporen befinden sich zu 8 in Schläuchen, sind 20-24 x 11-14 µm gross und haben manchmal kleine Tröpfchen ausserhalb den Polen. Merkmal der Gattung Morchella.



# *Morchella gigas*

## Käppchenmorchel

Diese Morchel besteht aus einem grossen Stiel und kleinem Hut. Der Stiel ragt in den Hut hinein ist jedoch nicht mit der Huthaut direkt verwachsen. Unterschied zu der Spitzmorchel. Die Sporen sind 22-25 x 12-15 µm gross und haben Tröpfchen an den Polen.



## *Verba conica* Fingerhutverpel

Foto: Theo Bischof

Die Verpel sind selten geworden. Verpel unterscheiden sich durch den Anwuchs des Stieles. Dieser ist direkt am Hütchen angewachsen. Mikroskopisch sind keine Unterschiede gegenüber den Morcheln fest zu stellen. Die böhmische Verpel (*Ptychoverpa bohemica*) unterscheidet sich durch zweisporige Asc. Sie ist noch seltener geworden.



# *Disciotis venosa* Morchelbecherling

Dieser Becherling wird bis 150 mm gross und hat einen starken Chlorgeruch. Die Mikromerkmale sind fast identisch wie bei den Morcheln. Ausser die Paraphysen, diese haben apikal einen braunen Inhalt. Melzer negativ.



## *Coprinus radicans* Rötlicher Filztintling

Ebenfalls sehr selten ist dieser Pilz. Im Verbreitungsatlas nur einmal von Peter Baumann eingetragen. Er steht dem *C. domesticus* sehr nahe, hat jedoch einen braun-orangen Basalfilz. Die Sporen messen  $8,5\text{--}11 \times 5\text{--}6,5 \mu\text{m}$  und sind elliptisch bis bohnenförmig.



# *Pholiota aporos* Frühlingsglockenschüppling

Die Glockenschüpplinge zeichnen sich durch die ballonförmige HDS aus und haben keine lethythiformen Zystiden wie die Conocyben. Die Sporen dieser Art sind ohne Keimporos, 6,5-10 x 4-5 µm. Die hängende Manchette ist gut entwickelt. Die Zystiden sind zylindrisch.

Foto: Theo Bischof



## *Entoloma vernum* Frühlings-Rötling

Hut bis 45 mm. Geruch etwas spermatisch. Lamellen jung grauweiss. Sp. 8-11 x 7-9 µm, keine Zystiden. Hyphen braun inkrustiert, mit Septen, Zelllänge über 100 µm. Kaulozystiden an der Stielspitze. Wie der Name sagt erscheint er nur im Frühjahr. Er gilt als giftig.

Foto: Theo Bischof



# Pilze bis 30. April 2021

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Cerrena	unicolor		
2 Conocybe	semiglobata	Kühn. & Watl.	Halbkugeliges Samthäubchen
2 Conocybe	spec.		
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Coprinus	radicans	Desm.	Rötlicher Filztintling
2 Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2 Hygrophorus	arbustivus	(Fr.) Fr.	Faserhüttiger Schneckling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
2 Lentinellus	ursinus	(Fr.) Kühn.	Filziger Zähling
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Mycena	polygramma fo. pumila	J.E. Lange	Rillstieler Helmling (kleine form)
2 Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
2 Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2 Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2 Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
4 Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4 Chondrostereum	purpureum	(Pers.: Fr.) Pouzar	Violetter Schichtpilz
4 Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4 Coriolopsis	trogii	(Berk.) Doman.	Blasse Borstentramete
4 Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
4 Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4 Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4 Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4 Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4 Ganoderma	resinaceum	Boud. in Pat.	Harziger Lackporling
4 Gleoporus	dichrous	(Fr.) Bres.	Zweifarbiger Gallertporling
4 Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4 Hydnus	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze bis 30. April 2021

4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Inonotus	radiatus	(Sow. ex Fr.) Karst.	Erlen-Schillerporling
4	Irpex	lacteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Milchweisser Eggenpilz
4	Meruliuspis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	pholopholiota	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	leptocephalus (varius)	Jacquin: Fr.	Löwengelber Porling
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlich Resupinatstacheling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Striegeliger Schichtpilz
4	Stereum	rameale	(Pers.: Fr.) Burt	Ästchen-Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jüл.	Zonen-Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Exidia	truncata	Fr.: Fr.	Becherförmiger Drüsling
6	helveloid	plana / glandulosa	Fr.	Hexenbutter
7	Bisporella	pallescens	Pers.(Ex S.F. Gray) Carpenter & Korf	Blasses Buchenbecherchen
7	Daldinia	concentrica	(Bolton: Fr.) Cesati et DeNotaris	Konzentrischer Holzkohlenpilz
7	Dasyscyphus	virgineus	S.F. Gray	Weisses Haarbecherchen
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Lachnellula	subtilissima	(Cke.) Dennis	Weisstannen-Haarbecherchen
7	Morchella	gigas (=semilibera)	(Batsch:Fr.) Pers.	Käppchen-Morchel

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze bis 30. April 2021

7	Nectria	cinnabarina	
7	Sarcoscypha	coccinea	(Beck ex Saccardo) Boudier
7	Tuber	aestivum	(Fr.) Petrk
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.
7	Xylaria	hypoxylon	Nitschke
Total 70 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Birsfelder Hard

Weiher, wo das Trinkwasser geläutert wird.



# *Hydropus subalpinus* Buchenwald-Wasserfuss

Standort: In Buchenwäldern. Frühling – Herbst. Fruchtkörper: bis 80 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen 9 x 4 µm, hyalin, allantoid. Cheilocystiden mächtig, mit Pielo- und Caulozystiden.

Bemerkungen: Dieser Pilz erscheint bei uns hauptsächlich im Frühjahr, seltener im Herbst. Er gleicht einem kleinen Breitblatt-Rübling, jedoch kleiner und nicht mit einem radialfaserigen Hut. Auffallend sind die weißen, elastisch-zähen Lamellen, der etwas saftig wirkende Hut, die allantoiden Sporen und die mächtigen Zystiden. Er scheidet keinen Milchsaft aus, wie andere Arten dieser Gattung.



## *Trametes versicolor* Schmetterlingstramete

An Holz von Laubbäumen. Ganzes Jahr. Fruchtkörper bis 70 mm, dünn. Hut zoniert, glatt, Farben verschieden. Sporen 7 x 2 µm, hyalin. Hyphensystem trimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen.



# Pilze der Woche 22

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	erythropus		Flockenstieler Hexenröhrling
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieler Hexen-Röhrling
2 Agaricus	aestivalis	(Möll.) Pil.	Sommer-Egerling
2 Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2 Agrocybe	vervacti	(Fr.) Sing.	Hohlstieler Ackerling
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Crepidotus	mollis	(Schäff. L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen
2 Entoloma	sericeoides	(Lge.) Noord.	Seidenartiger Rötling
2 Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheriger Blassporräbling
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lyophyllum	rhopalopodium	Clmç.	
2 Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2 Mycena	filopes	(Bull.: Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Pluteus	cervinus		
2 Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2 Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
4 Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4 Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
7 Helvella	leucomelas	(Fr.) Fr.	Schwarzweisser Rippenbecherling
Total 22 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



## *Clitocybe fragrans* Dufttrichterling

Standort: Zwischen Nadel- und Laubstreu. Herbst und manchmal Frühling.  
Fruchtkörper: bis 50 mm groß. Mikromerkmale: Sporen 9,5 x 5 µm, hyalin.  
Bemerkungen: Der Dufttrichterling zeichnet sich aus durch die Größe, den Anis-Geruch  
und durch die großen Sporen ohne Tropfen. Es gibt noch mehrere nach Anis riechende  
Trichterlinge, hier muß man die Mikromerkmale beziehen, Sporenform,-Größe und -Inhalt,  
Huthaut, Substrat. Giftig.



# *Entoloma sericeoides* Seidenartiger Rötling

Foto: Theo Bischof

Sekion Papillata  
Pigment inkrustierend, meist ohne Cheilocystiden.  
Art: Hut bis 40 mm, oft etwas runzelig. Geruch und Geschmack mehlartig.  
Sp. 7,5-9,5 x 6,5-8,5 µm, rundlich, ohne Zystiden. HDS ohne Schnallen,  
braun inkrustiert.



# Pilze der Woche 23

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
2 Agrocybe	vervacti	(Fr.) Sing.	Hohlstieliger Ackerling
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen
2 Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheriger Blasssporrbüling
2 Gymnopus	aquosa	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübling
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lyophyllum	rhopalopodium	Clmç.	
2 Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2 Mycena	filopes	(Bull.: Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2 Pluteus	cervinus		Rehbrauner Dachpilz
2 Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
4 Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4 Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
7 Helvella	leucomelas	(Fr.) Fr.	Schwarzweisser Rippenbecherling
Total 19 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Arten in grüner Schrift sind  
eher selten



# *Lyophyllum rhopolopodium* Derbknölliger Rasling

4-8 (12) cm Ø, weißlich hellbraun bis dunkelbraun, olivgraubraun, haselnussbraun, stark hygrophan, auf Druck grauend, eingewachsen faserig, glatt. Habitus abgeflacht oder auch mit kleinem Buckel, oft etwas wellig oder gelappt. Lamellen: Weiß, schmutzig weißlich, bei Verletzung bräunend bis schwärzend. Stiel kräftig, 4-7 (8) cm lang, 5-12 (14) mm Ø dick, weißlich bis hellbräunlich, längsfaserig, streifig, etwas knorpelig, Basis spindelig, keulig-knollig, mit weißlichem Myzelfilz. Lamellen weißlich bis grau, alt schwärzlich, breit angewachsen, auch etwas herablaufend, gedrängt stehend, bei Berührung blass blaugrau bis grau, später schwarzfleckend, Schneiden gleichfarbig und glatt. Sporen pulverfarbe weiß (8-10,5 x 4,8-7,5 µm graubige, langgezogen, rautenförmig, breit spindeli schwach eingeschnürt, am Apex meist stumpf gerundet, am Apikulus spitz, meist mit 2 Öltropfen, Q = 1,6, Basi en viersporig, Schnallen vorhanden).



# Pilze der Woche 24

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1	Suillus grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
2	Agrocybe semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
2	Bolbitius vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Crepidotus variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüßchen
2	Entoloma plebejum	(Kalchbr.) Noord.	Voreilender Rötling
2	Entoloma vernum	Lundell	Frühlingsrötling
2	Gymnopus aquosus		Hellhütiger Waldfreundrübling
2	Hydropus subalpinus	(Höhn) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
2	Inocybe assimilata	(Britz.) Sacc.	Rundknölliger Risspilz
2	Inocybe fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Inocybe phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
2	Inocybe queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Marasmius alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieler Knoblauchschwindling
2	Marasmius androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Mycena abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pholiota populnea	(Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall.	Pappel-Schüppling
2	Pluteus nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Xerula radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Russula cyanoxantha		Frauentäubling
3	Russula grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
4	Hymenochaeta cruenta	(Pers.: Fr.) Donk	Blutroter Borstenscheibling
4	Polyporus squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Pulcherricum (Tevana) caeruleum	(Fr.) Parm.	Blauer Rindenpilz
7	Gyromitra gigas	(Schäff. ex Pers.) Quél.	Riesenlorchel
7	Paxina acetabulum	(Pers.) O. Kutze	Hochgerippter Becherling
7	Peziza arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
7	Sarcosphaera crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling (Beatenberg)
Total 32 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



## *Hypholoma radicosum* Wurzelnder Schwefelkopf

Geruch nach Gummistiefeln, Militärstiefeln, bitter. Hut 1-4 (6) cm Ø, ockerbräunlich, weiß bereift, Mitte oft dunkler, Rand mit Velumresten. Fleisch: Weiß bis hellgelb, an der Stielbasis ocker bis rotbraun. Stiel: 3-5 (7) cm lang, 3-6 (8) mm Ø dick, wurzelnd, weißlich flockig faserig, oft genattet, zur Basis braun, orangebraun, +/- hohl Lamellen grau-braun, ockerbraun, graulila, braunlila, niemals grün, angewachsen, manchmal mit Zahn etwas herablaufend, Schneiden weißflockig. Sporen pulverfarbe dunkelbraun-lila bis schwarzbraun ( $5,5-7,5 \times 3,4-4,3 \mu\text{m}$ , ellipsoid, ovoid, etwas seitlich abgeflacht, in KOH ockergelb, Q = 1,4-2, Basidien  $18-23 \times 5,5-7,5 \mu\text{m}$ , zwei- und viersporig, Chryzozystiden  $46 \times 11 \mu\text{m}$ .



# Pilze der Woche 25

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
2 Agaricus	aestivalis	(Möll.) Pil.	Sommer-Egerling
2 Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporiger Blutschampignon
2 Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2 Amanita	battaruae	(Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling
2 Amanita	ceceliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perl pilz
2 Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
2 Crepidotus	applanatus	Pers. Kummer	Gerief tes Stummefüßchen
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchengschwindling
2 Marasmius	bulliardii	Quél. Noordel.	Nadelstreu-Käsepilzchen
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Melanoleuca	verrucipes	(Fr.) Singer	Rauhsti el-Weichritterling
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2 Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3 Russula	romellii	Maire	Weisssti eliger Ledertäubling
3 Russula	vesca		Fleischroter Speisetäubling
4 Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4 Phaeolus	schweinizii		Kiefernbraunporling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
7 Scutellinia	scutellata	(Fuck.) Boud.	Holz-Schildborstling
Total 27 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Arten in grüner Schrift sind  
eher selten



# *Conocybe lactea* Milchweisses Samthäubchen

Standort: In Wiesen, Rasen. Sommer – Herbst. Fruchtkörper: bis 20 mm groß.  
Mikromerkmale: Sporen 14 x 9 µm, braun, dickwandig, mit Keimporus. Cheilocystiden gestielt kopfig. Hutdeckschicht hymeniform.  
Bemerkungen: Dieser Pilz ist meistens gesellig im Rasen und, Sportanlagen zu finden. Typisch sind die weissen, kegeligen Fruchtkörper und die hellbraunen, etwas bogig harablaufenden Lamellen.



## *Scutellinia scutellata* Holz-Schildborstling

Fruchtkörper 0,3-0,8 (1) cm Ø, becherartig, scheibenförmig, orange, Rand mit dunkelbraunen Borsten behaart. Fleisch weißlich, dünn, brüchig.  
Sporenpulver farblos, weiß (15,8-19,1 x 9,8-12,6 µm, Schläuche zylindrisch ca. 230-250 x 12-17 µm, die Paraphysen sind fadenförmig).  
Vorkommen: Auf Holz oder Erde wachsend, Folgezersetzer, Frühling bis Spätherbst.



# Pilze der Woche 26

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus I	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Leccinum	carpini		Hainbuchen-Rauhfuss
1 Leccinum	nigricans	(Richon & Roze) Sing.	Schwärzender Rauhfuss
1 Xerocomus	ferrugineus		
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Gymnopus	dryophilus	Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Gymnopus	fusipes	Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhn) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Inocybe	rimosa	Kuyp. Kegeliger	Kegeliger Risspilz
2 Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindling
2 Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2 Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2 Psilocybe	rhombispora		
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	cremor (rustratus)	Fr. Runziger	Zwergmilchling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	lutea	(Huds.: Fr.) Gray	Glänzengelber Dottertäubling
3 Russula	nigricans	Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3 Russula	puellaris	Fr. Milder	Wachstäubling
3 Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3 Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3 Russula	velutipes (aurora)	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4 Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4 Merulioopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
Total 30 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Gymnopus fusipes Spindeliger Rübling

Büsselfig an der Basis von lebenden Eichen. Hut bis 80 mm. Stiel nach unten verjüngt. Sp. 5-6,5x3-4 µm.



# Pilze der Woche 27/28

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2 Amanita	battaruae	(Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Streifling
2 Amanita	franchetii	(Boud.) Fay.	Rauher Wulstling
2 Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
2 Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2 Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieler Rübling
2 Inocybe	pusio	Karst.	Radialrissiger Risspilz
2 Inocybe	rimosa var. perlata	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolligstielfelter Schirmling
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2 Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
2 Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2 Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2 Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
7 Peziza	succosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling
7 Humaria	hemisphaerica	(Berk. & Br.) Nannf.	Halbkugeliger Borstenbecherling

Total 33 Arten

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# *Amanita franchetti*

## Rauher Wulstling

Geruch neutral bis angenehm. Hut 2-7 (9) cm Ø, gelblich, lehmgrau mit grauen und gelblichen flockigen Velumresten (gelbes VELUM UNIVERSALE). Fleisch weiß, nicht rötend. Stiel 5-8 (10) cm lang, 1-2 (2,5) cm Ø, weiß mit gelblich flockigen Warzengürteln, zylindrisch, Basis rüben- bis keulenförmig. Lamellen weiß. Sporen pulverfarbe weiß ( $7,5-11,5 \times 4,5-7,5 \mu\text{m}$ , oval). Vorkommen im Mischwald, bei Laub- und Nadelbäumen, kalkreichen Boden, häufiger im mediterranen Raum.



*Chamaemyces fracidus*  
Fleckender Schmierschirmling

Laub- und Nadelwald, Parks. Hut bis 60 mm,  
schwach schmierig. Stiel mit Ringzone. Sp.  
5-6x3,5-5 µm. Cheilocystiden flaschenförmig,  
apikal z.T. inkrustiert. HDS hymeniform.



# *Cortinarius bulbiger* Knolliger Schleierritterling

Geruch neutral bis würzig, oft etwas nach Sellerie. Geschmack mild. Hut 3-10 (12) cm, hellbraun, orangebraun, milchkaffeebraun, fleischbraun, ockerbraun, hasel- bis rötlichbraun, glatt, feucht glänzend, mit weißer Bereifung, jung mit Schleierhülle bis zum Stiel, manchmal leicht gebuckelt, Cortina vorhanden, Rand eingebogen. Fleisch weiß bis blass gelblich. Stiel 1-12 (16) cm lang, 1-2 (3) cm dick. Knolle abrupt knollig. Lamellen weißlich, cremefarben, am Stiel ausgebuchtet angew. Nadelwald, Symbiosepilz, gerne kalkreicher Boden, gesellig.



## *Lyophyllum paenichroum* Lemfarbener Schwärzlin

Geruch und Geschmack mehlartig Hut 4-7 (9) cm Ø, blass graubraun, hellbraun, haselnussbraun, braunbeige, schwärzend, hygrophan, Rand jung eingerollt, später gerippt-riefig, jung gewölbt, alt ausgebreitet und eingesenkt, Oberfläche trocken, glatt. Fleisch blassbraun, schwärzend, am Stiel schnell grauend bis schwärzend, faserig. Stiel: -4 (5,5) cm lang, 0,8-1,6 (1,8) cm dick, weißlich, blass graubraun, schmutzig creme, faserig, voll. Lamellen weiß, grau-weißlich, bei Druck schnell schwärzend, ausgebuchtet angewachsen, mit Zahn etwas herablaufend, gedrängt stehend, viele kürzere Zwischenlamellen. Sporen pulver weiß (5-9 x 5,5-6,3 µm, subglobos, glatt, Q = 1,1-1,3, Basidien 32-40 x 9-10 µm, viersporig, Cheilocystiden zylindrisch, lageniform, Hutdeckschicht mit glatten Zellen, Schnallen vorhanden). Vorkommen Mischwald, Parks, Nadelwald.



# Pilze der Woche 29/30

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1 Leccinum	nigricans	(Richon & Roze) Sing.	Schwärzender Rauhfuss
1 Xerocomus	ferrugineus		
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindling
2 Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2 Psilocybe	rhombispora		
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	cremor (rustratus)	Fr.	Runziger Zergmilchling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	lutea	(Huds.: Fr.) Gray	Glänzengelber Dottertäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3 Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3 Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3 Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3 Russula	velutipes (aurora)	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4 Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4 Meruliusp	corium	(Fr.) Ginn	Lederartiger FältlingTotal 31 Arten
Total 31 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# *Humaria hemisphaerica* Halbkugeliger Borstenbecherling

Erscheinungszeit: April bis November

Größe: 1-5 cm, bis 3 cm hoch.

Vorkommen in Laub- und Nadelwäldern, an Wegrändern, auf nackter Erde oder in Gras und Moos. Überall häufig. Fruchtkörper schüsselförmig, ungestielt, Innenseite hellgrau, Außenseiten und Becherränder braun borstig behaart. Geruch und Geschmack unauffällig.



# Pilze der Woche 31 Beatenberg

1 Boletus	calopus	Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perl pilz
2 Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2 Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2 Cortinarius	epipoleus	Fr.	Stahlgrauer Kleinspor-Schleimfuss
2 Cortinarius	furvolaesus		
2 Cortinarius	scaurus	(Fr.: Fr.) Fr.	Olivblättriger Klumpfuss
2 Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2 Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
2 Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2 Inocybe	rimosa var. perlata	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieler Risspilz
2 Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2 Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2 Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Gillet	Lästiger Ritterling
3 lactarius	rufus	(Scopoli: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4 Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4 Clavulina	rugosa	(Bull.: Fr.) Schröt.	Runzlige Koralle
Total 27 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Inocybe terrigena

## Schuppenstieler Risspilz

Geruch neutral bis etwas erdig, muffig. Geschmack bitterlich, unangenehm Hut: 2-7 (8) cm , beige bis hellocker, ockerbraun, hellbraun, uneben, nur etwas rissig, angedrückt schuppig, Rand faserig behangen. Fleisch hellgelb bis zitronengelb, an der Stielspitze dicker. Stiel 3-8 (11) cm hoch, 7-18 (24) mm dick, schmutzig weiß bis gelbbraun, Basis dunkler gelbbraun, mit Ringzone, Oberfläche sparrig-schuppig. Lamellen beige, elfenbeinweiß, alt rotbraun, angewachsen mit Zwischenlamellen. Sporenpulver erdbaun, lehmbräun (9-11 x 5-6,6 µm, nierenförmig, glatt). Cheilocystiden dünnwandig, ohne Kristalle. Vorkommen: Mischwald, lichten Wäldern, Halden, am Wegrand, auf Dünen, Geröllfeldern, gern trockenen, sandigen, kiesigen, kalkreichen Boden, Symbiosepilz, Sommer bis Herbst.



# Inocybe bongardii

## Duftender Risspilz

Geruch obstartig, nach Früchten, Bonbons, Geruch ähnelt dem Birnenrisspilz. Geschmack mild. Hut 3-5 (6) cm, auf hellbraunem Untergrund dunkle anliegende Schuppen, rissig, als auch gänzlich bräunlich. Fleisch weißlich, langsam rötend. Stiel 3-8 (11) cm lang, 1-1,5 (2) cm Ø dick, jung Spitze cremeweiß, ansonsten weißlich, später bräunend, rotbräunlich verfärbend, faserig. Lamellen jung beige-weißlich, später bräunlich mit rötlichem Hauch, zimtbraun, Schneiden weißlich bewimpert. Sporenpulver zimtbraun (10-14 x 6-8 µm, elliptisch, glatt). Vorkommen Mischwald, gern Laubwald, Buche, gern kalkreichen Boden, Symbiosepilz, Sommer bis Herbst.



# *Cortinarius camphoratus* Bocks-Dickfuss

Im Nadelwald. Hut bis 60 mm. Fleisch weisslich, oft mit Lilastich. Geruch widerlich, wie Bocksgestank. Sp. 8,5-11,5x5,6,5 µm, schwach warzig, Cheilozystiden spindelig bis flaschenförmig. HDS kutikulär, Subkutis mit kurzgliederigen Hyphen.



# *Cortinarius speciocissimus* Spitzgebuckelter Raukopf

Geruch leicht rettchartig. Geschmack mild, leicht rettchartig. Hut 3-6 (9) cm, braun, rotbraun, orangerot, meist leicht spitz gebuckelt, radialfaserig, feinschuppig, rau wirkend. Fleisch gelblichbraun, gelbrötlich, rostbraun, in der Stielbasis orangebraun, faserig. Stiel 5,5-11 (13) cm lang, 0,5-1,6 (2) cm dick, rostbraun, keine Spuren einer Ringzone, dennoch meist genattert durch Velumreste (Schleierreste), voll, faserig, fein samtig, Basis leicht verdickt. Lamellen: Zimtbraun, dick, breit, ausgebuchtet angeheftet, manchmal mit Zahn leicht herablaufend, mit Zwischenlamellen. Sporenpulver rostbraun (9-11 x 7-8 µm, oval, feinwarzig, hyalin, gelbocker in KOH, Basidien 29-36 x 9-11. Vorkommen: Nadelwald, gern Fichte, gern in Moore, sauren Boden, Symbiosepilz, Sommer bis Spätherbst.



# Pilze der Woche 32

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Fr. Berk.	Strubelkopfröhrling
2 Amanita	cecliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönpkopf
2 Clitocybe	foetens	Melot	Stinkender Trichterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	odora	(Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2 Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2 Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkopf
2 Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Entoloma	sinatum	(Buillar Fr.) Kummer	Riesen-Rötling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
2 Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2 Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieler Risspilz
2 Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieler Risspilz
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Lepiota	subgracilis	Kühn.	Schüppchen-Schirmling
2 Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2 Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2 Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3 Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3 Lactarius	cremor (rustratus)	Fr.	Runziger Zergmilchling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 32

3	Lactarius	deterimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	hepaticus	Plowrhigt	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustielräubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Cantharellus	tubaformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Hydnnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
5	Gastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
7	Helvella	crispa	(Scopoli: Fr.) Fr.	Herbst-Lorchel
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel
7	Peziza	succuosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling
Total 65 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# *Cortinarius caerulescens* Blauer Klumpfuß

Geruch unangenehm stinkend. Geschmack mild. Hut 5-10 (12) cm, zuerst blau-violettgrau, blaugrau, später ausblassend, Haut abziehbar, feucht schmierig. Fleisch weiß, im Stiel später hellviolettblau, später grauviolett, unter der Huthaut +/- etwas gelb, alt von der Basis aus rot- bis gelbbraun verfärbend. Stiel violettgrau, Haarschleier ebenfalls violettgrau, Schleierreste gelblich-weißlich bis blassocker, Basis breitknollig-klumpig verdickt, jung weiß, später gelb bis alt braun verfärbend. Lamellen violettbraun, blauviolett, bräunlich, später hellbraun, gelbbraun. Sporenpulver gelblich-rostbraun ( $8,5-12 \times 1,7-6 \mu\text{m}$ , mandelförmig, warzig). Vorkommen: Laubwald, vorwiegend bei Buchen auf kalkreichen Boden, Sommer bis Herbst, sehr selten, RL Schweiz (EN = stark gefährdet).



# *Lepioa subgracilis* Breitsporiger Schirmpilz

Mikromerkmale: Sporen 10,2 - 11,5 x 5,0-5,8 µm, glattwandig, farblos, dextrinoid. Sporenpulver weiß. Basidien 21-30 x 8-11 µm, viersporig, keulig. Cheilocystiden keulig, spindelig oder zylindrisch, auffallend oft mit ausgezogenem oder sogar mit leicht kopfigem Spitzchen, stets mit großen Schnallen an der Basis. HDS aus braun pigmentierten Hyphen mit aufgerichteten, langzylindrischen Endzellen und kurzzyllindrischen Grundgliedern mit deutlichen Schnallen.



# *Helvella macropus* Langstiellige Becherlorchel

Hut 1-4 (5) cm Ø, graubraun, ockerbraun, becherförmig, Hutrand filzig. Becherinneres glatt, außen körnig besetzt. Fleisch weiß, grau, graubraun, ockergrau, elastisch, brüchig, splitternd. Stiel graubraun, filzig, samtig, körnig, teilweise mit angedeuteten Rippen. Hutunterseite graubraun, filzig, körnig bestäubt. Sporen pulver weiß, transparent, farblos ( $21-24 \times 9,9-12 \mu\text{m}$ , schlank elliptisch und fein punktiert). Vorkommen meist Laubwald, gelegentlich Mischwald, auf nackter Erde, Gras, Folgezersetzer (saprobiontisch), Sommer bis Herbst, sehr selten.



## *Helvella crispa* Herbstlorchel

Fruchtkörper bis 150 mm hoch. Sp. 17-20 x 10-12 µm, fast zylindrisch, oft mit Warzen. Die ähnliche *H. lactea* hat rundliche Sp. Vorwiegend im Herbst.



# Pilze der Woche 33

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	calopus	Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1 Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1 Xerocomus	communis, engeli	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1 Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2 Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlporz
2 Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2 Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2 Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2 Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2 Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	foetens	(Phillips in Berk. & Br.) Arn.	Stinktäubling
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4 Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
5 Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
5 Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
6 Tremiscus	helvelloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
Total 32 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# *Clitocybe clavipes* Keulenfüssiger Trichterling

Hut bis 60 mm. Geschmack mild. Lamellen zuerst weisslich, dann gelblich werdend. Stielbasis aufgeblasen, weich. Sp. 5,6-7,8x3,5-5 µm. HDS kutikulär mit Schnallen. Vermutlich an Nadelhölzer gebunden.



# *Cortinarius violaceus*

## Violetter Dickfuss

Im Laub- und Nadelwald. Hut bis 100 mm.  
Fleisch violett. Sp. 11-14x8-10 µm, breitelliptisch,  
mässig warzig, Zystiden flaschenförmig.  
HDS kutikulär bis aufsteigend.



# *Cortinarius melanotus* Braunnetziger Raukopf

Geruch erdig, muffig, eventuell auch nach Petersilie. Geschmack mild, erdig, muffig; niemals probieren, da die Inhaltsstoffe Organe wie Nieren oder Leber schädigen können! Hut 3-6 (8) cm, bräunlich, mit schwärzlich-olivfarbigen rau-körnigen Schüppchen punktiert, halbkugelig. Fleisch: gelblich, grüngelb, olivegelb, gelbbraun, teils weisslich marmoriert, Fleisch am Rand der Stielbasis oft olivrötlch bis olivebraun, im Hut dunkler oliv, faserig. Stiel 3-5 (7) cm lang, 0,5-1 (1,5) cm dick, weißlich, mit umbrabraunen Schüppchen dicht bedeckt, Basis verdickt, etwas spindelig. Lamellen jung olivgrün, gelblich-bräunlich, olivebraun, ausgebuchtet angewachsen, mäßig gedrängt. Vorkommen Laubwald, Symbiosepilz, Sommer bis Herbst, extrem selten. Sporen pulverfarbe rostbraun ( $6-8 \times 4,7-6,5 \mu\text{m}$ , subglobos, warzig bis stachelwärzig, Q = 1,1-1,4).



# *Cortinarius rubicundulus* Gilbender Raukopf

Geruch unbedeutend bis leicht nach Rettich. Geschmack bitter. Hut 2-8 (11) cm Ø, ockergelb mit rötlichen Fasern, selten etwas kleinschuppig, matt und stets rau, Rand lange eingebogen, alt verbogen, jung gelblich faserig. Habitus halbkugelig, glockig, später unregelmäßig kegelig. Fleisch im Hut weiß, im Stiel ockergelb, stark gilbend, später rötend, faserig, fleischig. Stiel bräunlich, faserig, mit rötlichen Schüppchen, Basis rötlich bis orangerot, keine Knolle. Lamellen ockerlich schmutzige gelb-weißlich, rotbraun, später zimtocker, angewachsen, Schneide ockergelb bis karminrot bleibend, alt gezahnt. Sporen pulverfarbe zimtbraun ( $6,8-8,3 \times 4,1-5 \mu\text{m}$ , rundlich bis elliptisch, feinwarzig, Hyphen der Hutdeckschicht ca.  $10-20 \mu\text{m}$  breit). Mit echten Zystiden.



## *Boletopsis leucomelaena* Grauer Russporling

Geruch neutral. Geschmack mild, manchmal leicht bitterlich. Hut 4-12 (15) cm Ø, graubraun, olivbraun, alt fast schwarz, bei Verletzung der Huthaut leicht rosa. Fleisch weiß, bei Verletzung zuerst rosa, dann graubraun. Stiel dunkelgrau, schwarzbraun, olivgrau, rundlich, in der Basis gern rosalich. Röhren, Poren weißlich, später grau, eckig, leicht herablaufend. Sporenpulverfarbe: hellgrau (5-6 x 4-5 µm). Vorkommen Mischwald, meist Nadelwald, meist in höheren Lagen, Bodenbewohnend, Folgezersetzer, Sommer bis Herbst.

Foto Theo Bischof



# Pilze der Woche 34

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieler Hexen-Röhrling
1 Gyroporus	cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling
2 Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2 Cortinarius	gentilis		Goldgelber Raukopf
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Crepidotus	applanatus	Pers. Kummer	Geriefes Stummefüßchen
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Risspilz
2 Inocybe	flavella	P. Karst.	
2 Inocybe	fraudans	Kühn.	Umberbrauner Risspilz
2 Mycena	capillaris	Peck	Haarstieler Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2 Pleurotus	pulmonarius	Quelet	Lungen-Seitling
2 Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3 Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltaubling
3 Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
4 Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde



Laufental - Thierstein

# Pilze der Woche 34

4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling	1 Boletales
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling	2 Agaricales
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling	3 Russulales
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern	4 Aphylophorales
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel	5 Gastromycetes
Total 38 Arten					



# Inocybe flavella

## Weißen Scheiteliger Risspilz

Geruch spermatisch. Geschmack mild, giftig. Hut 1-4 (5) cm Ø, dunkelbraun, kastanienbraun, gelbbraun, strohgelb mit braunen Tönen, radialrissig, Scheitel weiß-schimmerartig bestäubt, oft kaum erkennbar. Fleisch weißlich-bräunlich. Stiel 3-9 (11) cm lang, 1-1,7 (2,1) cm dick, bräunlich mit wollig-weißlichen, hellbräunlichen Flocken. Lamellen schmutzig-weißlich, cremegelblich, rotbraun bis schmutzigbraun. Sporen pulver tabakbraun (9-12 x 5-7 µm). Zystiden dünnwandig, ohne Kristalle. Vorkommen Mischwald, Symbiosepilz, Sommer bis Herbst, sehr selten RL Schweiz (EN = stark gefährdet).



# Inocybe mixtilis

## Gerandetknölliger Risspilz

Hut bis 35 mm. Stiel jung weiss mit knölliger Basis. Geruch säuerlich. Sporen 8-9,5x6-6,6 µm. Zystiden bauchig mit ziemlich grossem Wandabstand. Caulozystiden bis zur Stielbasis. Hauptsächlich bei Nadelbäumen.



# Pilze der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	calopus	Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1 Phylloporus	pelletieri	(Lév.) Quél.	Goldblatt
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Cortinarius	cyaneus	(Bres.) Mos.	Blauer Schleimkopf
2 Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2 Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Entoloma	rhodopolium var. nidorosum		(Fr.) Nordel./Kumm. Alkalischer Rötling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2 Inocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Risspilz
2 Inocybe	fraudans	Kühn.	Umberbrauner Risspilz
2 Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2 Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2 Panaeolus	fimicola	(Fr.) Gill.	Mist-Düngerling
2 Psathyrella	pseudogracilis	(Romagn.) Mos.	Zierlicher Faserling
2 Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2 Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2 Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Gillet	
2 Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2 Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	aconites		

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 35

3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud.Neuh)	Flattermilchling
3	Russula	adulterina	Fr. ss. Rom.	Scharfer Brauntäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	claroflava	Grove	Gelber Graustielräubling
3	Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustielräubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivascens (postiana)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelvioletter Pfifferling
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Fomitopsis	rosea	(Albertini et Schweiniz: Fr.) Karsten	Rosenroter Baumschwamm
4	Hydnnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	flavidus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
6	Tremiscus	helvelloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhring
Total 68 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Otidea concinna Zitronengelber Öhring

Fruchtkörper 2-6 (8) cm Ø, 1-5 cm hoch, zitronengelb, ohrförmig, kelchartig, Rand eingerollt, die Innen- und Außenschicht haben die gleichen Farben, zuletzt feingesäzte Fruchtscheibe. Fleisch weißlich, zerbrechlich. Stiel kurz, Basis weißlich. Sporen pulverfarbe gelblich (10-13 x 5-6 µm, Ascii 150 x 10 µm).



# *Cortinarius largus* Blasser Schleimkopf

Hutgrösse bis 80 mm. Lamellen lehmgrau, violettgrau. Fleisch violettblau, schnell weisslich. Velum weiss. Geruch staubartig. KOH bräunlich mit gelber Umrandung. Sporen 9,5–12x5–6,5. Laubwald. Ähnlich soll *C. cyanobasalis* mit Blaufärbung der Trama und grösseren Sporen sein.



# *Cortinarius lividoviolaceus* Graufioletter Schleimkopf

Hutgrösse bis 70 mm. Lamellen und Stiel violett, graulila. Fleisch blassviolett bis mässig violett. Lumen beachten. Stiel jung manchmal mit zottigem Velum. Geruch süßlich nach Obst. Amoniak im Fleisch chromgelb. Sporen 9–11x5–6, mandelförmig. Laubbäume. Schwierig von *C. largus* und *C. variicolor* var. *nomorensis* zu trennen, hat jedoch etwas kleinere Sporen.



# *Psathyrella pseudocracilis* Zierlicher Mürbling

Geruch Mehlig. Geschmac mild, unbedeutend. Hut 1-2,5 (3,5) cm, rotbraun, ockerbraun, rußbraun, graubraun-schwarzbraun, orangebraun, ausblassend (hygrophan), durchscheinend gerieft, Mitte dunkler braun, Rand blasser, Velum sehr spärlich und schnell flüchtig. Fleisch cremefarbig, hellbraun, dünn. Stiel weisslich oder bräunlich, sehr variable, dünn, bereift, steif, hohl, Basis filzig. Lamellen weißlich-graubraun, blass-braun, schwarzbraun, dunkelbraun, entfernt stehend, angewachsen, +/- mit Zahn herablaufend. Sporen pulverfarbe schwarz mit Rotton (10-17,5 x 5,5-7,5 µm, ellipsoid, schlank eiförmig, in KOH schwarzbraun mit einem purpurnen Ton, Cheilocystiden 24,5-75 x 7-27 µm, Basidien 16,5-35 x 8-13,5 µm). Vorkommen Parks, Waldwege, Totholz, Holzspäne, nährstoffreichen Boden, Folgezersetzer, Frühling bis Spätherbst



# Pilze der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Leccinum	nigricans	(Richon & Roze) Sing.	Schwärzender Rauhfuss
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1 Xerocomus	communis, engeli	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1 Xerocomus	pruinatus	(Fr.) Quél.	Stattlicher Rotfuss-Röhrling
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieler Knoblauchschwindling
2 Mycena	crocata	(Schrader: Fr.) Kummer	Gelborangemilchendet Helmling
2 Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2 Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2 Tricholoma	sulphureus		Schwefelritterling
3 Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4 Abortiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4 Hydnus	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Hydnus	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4 Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4 Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4 Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
5 Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
7 Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
Total 30 Arten			

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphylophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)

Verein für Pilzkunde



Laufental - Thierstein

## *Meripilus giganteus* Riesenporling

Hut 4-30 (200) cm, samtig, braun, fächerförmig überlappend verwachsen, aus einem gemeinsamen Strunk herauswachsend, Rand wellig dünn, gelbbraun bis rotbraun gezont Fleisch weiß, leicht gelblich, weich. Stiel: Verbogen, weiße Basis bräunlich getupft, gern seitinstielig. Poren, Röhren weißlich-gelblich, herablaufend, auf Druck schwärzend. Sporenpulverfarbe weiß ( $5-8 \times 4-7 \mu\text{m}$ , breit elliptisch, glatt). Vorkommen Mischwald, im Nadelwald gern Weißanne, im Laubwald gerne Buche, Folgezersetzer, Sommer bis Herbst.



# Pilze der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Name botanisch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	erythropus var. discolor	(Quélet) Alessio	Varietät vom Schuster
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Chalciporus	piperatus	(Bulliard: Fr.) Bataille	Pfeffer-Röhrling
1 Omphalotus	illudens	(Schw.) Sacc.	Leuchtender Ölbaumpilz
1 Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1 Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Agaricus	essetei	Bon	Schiefkolliger Anis-Champignon
2 Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporiger Blutschampignon
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
2 Amanita	battarrae	(Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2 Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2 Cortinarius	cyaneus	(Bres.) Mos.	Blauer Schleimkopf
2 Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2 Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2 Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
2 Leucopaxillus	candidus	Singer	Kleiner Riesen-Krempeentrichterling
2 Limacella	glioderma	(Fr.) Konr. & Maulb.	Schmieriger Schleimschirmling
2 Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzter Rasling
2 Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	Goldfarbener Glimmerschüppling
2 Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 37

2	Pleurotus	pulmonarius	Quelet	Lungen-Seitling
2	Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Pluteus	cervinus		Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2	Rhodocollybia	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
2	Tricholoma	imbricatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Feinschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	ustaloides	Romagn.	Bitterer Eichenritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltaubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
4	Hydnus	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Sarcodon		(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
7	Choiromyces	venosus	(Fr.) Th. Fries	Stachelsporiger Mäandertrüffel

Total 71 Arten

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Gymnopus peronatus Brennender Blasssporrübling

Im Laub- und Nadelwald, auf Blättern aufsitzend.  
Hut bis 50 mm. Stiel knorpelig, zäh. Geschmack  
scharf, Geruch essigartig. Sp. 7,5-11 µm.



# Gymnopus confluens

## Knopfstieliger Blasssporübling

In Laub- und Nadelwälder. Hut bis 40 mm. Geruch und Geschmack mild. Stiel oben knopfstielig erweitert (lässt sich vom Hut gut trennen), keiig. Sp. 6-9,5x2,5-3,5 µm. HDS unregelmässig verflochten. Mit Stielhaaren.



# Pilze der Woche 38

Gattung	Art	Autor	ame botanisch
1 Omphalotus	illudens	(Schw.) Sacc.	Leuchtender Ölbaumpilz
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	ferrugineus		
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2 Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2 Inocybe	hirtella var. bispora	Kuy.	Zweisporiger Bittermandel-Risspilz
2 Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad.	Wasserfleckiger Rötelritterling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Mycena	crocata	(Schrader: Fr.) Kummer	Gelborangemilchendet Helmling
2 Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieler Helmling
2 Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2 Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2 Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2 Tricholoma	sculpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2 Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2 Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2 Tricholoma	subsejunctum		
2 Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	subdulcis	(Pers.: Fr.) Gray	Süßlicher Buchen-Milchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3 Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschröter Speitäubling
3 Russula	faginea	Romagnesi	Buchen-Heringstäubling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 38

3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3 Russula	graveolens	Romell	Fleischvioletter Heringstäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	levida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieler Ledertäubling
3 Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3 Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3 Russula	velutipes (aurora)	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Total 49 Arten			

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphylophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



*Russula rubra*  
Scharfer Zinnobertäubling

Fruchtkörper bis 80 mm, matt. Spp. gelb. Sporen 7–9 x 6,5–8 µm, mit stumpfen, kurz gratig verbundenen Warzen. Mit Pileozystiden. Spp. gelb. Geschmack sehr scharf.



*Russula virescens*  
Gefeldeter Täubling

Laub- und Nadelwald. Fruchtkörper bis 150 mm. Ohne Pileozystiden. Sporen 6–8,5 x 5–6,5 µm. Spp. weiss. Buchen und Eichen.



# Pilze der Woche 39

Gattung	Art	Autor	name botanisch
1 Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1 Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1 Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
2 Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2 Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2 Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2 Clitocybe	odora	(Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2 Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2 Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2 Cortinarius	hinnuleus	Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2 Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2 Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2 Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2 Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2 Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2 Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
2 Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2 Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Inocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Risspilz
2 Inocybe	asterospora	Quélet	Sternsporiger Risspilz
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Lacrymaria	pyrrotricha	(Holmsk.)	Feuerfarbener_Saumpilz
2 Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolligstiefelter Schirmling
2 Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde



Laufental - Thierstein

# Pilze der Woche 39

2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Marasmius	winnei	Berk & Br.	Violettlicher Schwindling
2	Meripilus	giganteus	(Pers: Fr.)	Gemeiner Riesenporling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieler Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Tricholoma	basirubens	Bon	Rosafüssiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violetmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	serifluus	(De Candollo: Fr.) Fr.	Wässriger Milchling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha		Frauentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieler Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull:) ex Pers.	Dünnschaliger Kartoffelhartbovist
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
Total 65 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



## *Clitocybe phaeophthalma* Ranziger Trichterling

Geruch erdig, ranzig, sehr unangenehm. Geschmack leicht bitterlich. Hut 3-7 (9) cm, weißlich, kahl, stark hygrophan, frisch leicht schmierig, Mitte dunkler vertieft trichterförmig genabelt, Rand lange heruntergebogen und dunkel bleibend, später heller werdend meist etwas wellig, +/- fein durchscheinend gestreift. Fleisch weißlich, cremeweiß, nicht verfärbend, faserig. Stiel 2-4 (5) cm, 5-6 (7) mm dick, weißlich bis hellgelb, hellbraun, längsfaserig, zylindrisch, Spitze verdickt, alt hohl, Basis mit Myzelfilz. Lamellen weißlich. Hutdeckschicht aufgeblasenen. Schnallen vorhanden). Vorkommen Mischwald, häufiger im Laubstreu, seltener im Nadelstreu, Folgezersetzer, Sommer bis Herbst.



## Ramaria flava Gelbe Koralle

Geruch pilzartig würzig, teil auch unbedeutend bis herb. Geschmack neutral, an den Spitzen alt bitterlich. Fruchtkörper 0,5-1 (1,2) cm Ø, zu Büscheln bis 15 (25) cm Ø, gelb, ganz jung auch etwas weißlich, später goldgelb, schwefelgelb ausblassend, aus einem weißen Strunk entspringend, ästig verzweigt. Unterseite jung weißlich, später zunehmend gelblich werdend. Fleisch schmutzig-weiß, im Strunk marmoriert, milchweißlich, nicht verfärbend auf Druck, brüchig, weich. Stiel/Strunk schwefelgelb, hell dottergelb, auch grünlich, Astspitzen gleichfarbig, Basis weißlich, dick, fest, +/- mit fleischrötlichen Flecken, sehr gedrängt (eng) stehend. Sporen pulverfarbe creme-ocker (11-18 x 4-6,5 µm). Vorkommen Laubwald, gern bei Buchen, Fichten, auf kalkreichen Boden, Symbiosepilz, Sommer bis Herbst.



# Pilze der Woche 40

Gattung	Art	Autor	name botanisch
1	Leccinum scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Xerocomus porosporus	(Imler ex Romero et Bon) Contu	Düsterer Rotfuss-Filzröhrling
2	Amanita citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlspelz
2	Clitocybe nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe odora	(Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitopilus prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus atramentarius	(Bulliard: Fr.) Fr.	Grauer Faltentintling
2	Cortinarius largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
2	Cortinarius torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Echinoderma asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Hygrophorus agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus latitabundus	Britz.	Grauweisser Schneckling
2	Inocybe fraudans	Kühn.	Umberbrauner Risspilz
2	Inocybe geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Kuehneromyces mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lacrymaria lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz var.
2	Lepiota felina	(Pers.: Fr.) Karst.	Katzen-Schirmling
2	Lepiota ventriospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista splendens	(Pers.: Fr.) Konrad.	Wasserfleckiger Rötelritterling
2	Macrolepiota rachodes var. Rachodes		Safran-Riesenschirmling
2	Marasmius alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieler Knoblauchschwindling
2	Marasmius cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieler Schwindling
2	Marasmius winnei	Berk & Br.	Violettlicher Schwindling
2	Mycena crocata	(Schrader: Fr.) Kummer	Gelborangemilchendet Helmling
2	Mycena inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieler Helmling
2	Mycena pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Nyctalis asterophora	Fr.	Stäubender Zwitterling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 40

2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2	Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	sulfurescens	Bres.	Gelbweisser Ritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Pers.: Fr.) Gray	Süßlicher Buchen-Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Grifola	frondosa	(Dicks.: Fr.) Gray	Klapperschwamm
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
5	Gastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
7	Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
Total 68 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



Amanita citrina  
Gelber Knollenblätterpilz

Hut citronengelb, bleich-gelb, bleich-grün-gelb. Geruch kartoffelartig. Universalvelum bräunlich. Marginalzellen keulig bis ballonförmig.  
Sp. 7,5-11x7-10 µm.



# Mycena rosea Rosa Rettichhelmling

Geruch rettichartig. Geschmack rettichartig, mild. Hut 1-5 (6) cm Ø, kräftig rosa, ausbleichend (hydrophan) nie sehr farbig, Rand gerieft. Fleisch dünn, weich, weißlich. Stiel meist weißlich bis hellrosa, faserig gedreht, Basis weißfilzig, verdickt. Lamellen weißlich mit rosa Ton, Mitte ausgebuchtet, fast frei wirkend, später angewachsen, Schneiden heller oder gleichfarben Sporen pulverfarbe weiß ( $7-8,5 \times 4-5 \mu\text{m}$ ,  $Q = 1.5-1.9$ ,  $Q_{av} = 1.7$ ). Vorkommen Mischwald, Folgezersetzer, Sommer bis Herbst. Unterscheidet sich hauptsächlich von *M. pura* durch die nichtbauchigen Cheilozystiden.



# Pilze der Woche 41

Gattung	Art	Autor	name botanisch
1 Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1 Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1 Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
1 Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
2 Agaricus	essettei	Bon	Schiefnölliger Anis-Champignon
2 Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlspelz
2 Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2 Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	odora	(Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2 Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2 Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsig Rauhkopf
2 Cortinarius	raphanoides	(Fr.) Fr.	Rettich-Schleierling
2 Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Hebeloma	theobrominum		Kakaofälbling
2 Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2 Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	asterospora	Quélet	Sternsporiger Risspilz
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2 Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2 Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzter Rasling
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2 Marasmius	winnei	Berk & Br.	Violettlicher Schwindling
2 Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde



Laufental - Thierstein

# Pilze der Woche 41

2 Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2 Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2 Tricholoma	myomyces	(Pers.: Fr.) Lge.	Maus-Ritterling
2 Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
2 Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3 Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3 Lactarius	glycosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3 Lactarius	subdulcis	(Pers.: Fr.) Gray	Süßlicher Buchen-Milchling
3 Lactarius	zonaroides	Kühner et Romagn.	Montaner Zonen-Milchling
3 Russula	foetens	(Phillips in Berk. & Br.) Arn.	Stinkäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
6 Tremiscus	helvelloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling

Tottal 51 Arte

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# *Laccaria amethystea*

## Violetter Lacktrichterling

Hut 1-8 (10) cm, ganz selten auch bis 15 cm Ø, lila, bläulich, violett, rosaviolett, später ausblassend und grau-weiß erscheinend (= stark hygrophan). Fleisch lila, bläulich, violett, violettrosa, wässrig, dünn. Stiel ca. 3-8 (selten auch bis 25) cm hoch, lila, verdreht, wellig verbogen, weißlich längs gefasert. Lamellen lila (auch wenn der Hut schon weiß ausgebleicht ist), ausgebuchtet angewachsen und mit Zahn herablaufend. Sporen pulverfarbe weiß (7-10 µm, inamyloid). Mischwald, Symbiosepilz, Frühsommer bis Spätherbst.



# *Marasmius wynnei* Violetter Schwindling

Geruch Blausäure ähnlich dem Nelkenschwindling, marzipanartig, später etwas muffig, unangenehm, faulig, heuartig. Geschmack mild aber unangenehm. Hut 2-5 (7) cm Ø, sehr variabel aber meist mit violetten Farbtönen: Weißlich, horngrau, violettgrau, graubraun, stark ausbleichend (hygrophan), Mitte stumpf gebuckelt. Fleisch weißlich, dünn. Stiel 4-6 (7) cm lang, 1-4 (5) mm Ø dick, Mitte bis Spitze weißlich bis cremefarben, nach unten zunehmend rotbraun, Basis myzelfilzig. Zäh. Lamellen weißlich, cremefarben, graubeige bis graulila, ausgebuchtet angewachsen, +/- mit Zahn herabgelaufen. Sporenpulverfarbe weiß (5-8 x 3-4 µm, elliptisch, glatt). Vorkommen: Mischwald, Parks, bei Laubbäumen, Folgezersetzer, die Art fruktifiziert auf Laubstreu oder morschem Holz, kalkreicher Boden, Frühsommer bis Spätherbst, selten.



# Pilze der Woche 42

Gattung	Art	Autor	
1 Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
2 Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2 Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2 Camarophyllum	russocoriaceus	(Berk. & Miller) Lange	Juchten-Ellerling
2 Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Coprinus	atramentarius	(Bulliard: Fr.) Fr.	Grauer Faltentintling
2 Coprinus	radicans	Desm.	Rötlicher Filztintling
2 Cortinarius	arquatus		
2 Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2 Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2 Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
2 Cortinarius	obtusus	(Fr.) Fr. non ss. Hry	Jodoform-Wasserkopf
2 Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
2 Cortinarius	pseudonapus	Hry. ap. Mos.	Fuchsighütiger Schleimkopfs
2 Cortinarius	sanguineus		Blutroter Hautkopf
2 Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2 Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2 Entoloma	sinatum	(Buillar Fr.) Kummer	Riesen-Rötling
2 Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2 Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2 Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2 Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolligstiefelter Schirmling
2 Lepiota	felina	(Pers.: Fr.) Karst.	Katzen-Schirmling
2 Lepista	graveolens	(Peck dermek	Starkkriechender Rötelritterling
2 Lyophyllum	boudieri	Kühn. & Romagn.	Russbraunes Graublatt
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 42

2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Pholiota	graminis	(Quél.) Sing.	Gras-Schüppling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.:Fr.) Lenn.	Butter Rosasporrybling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürterter Runzelmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3	Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltaubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
4	Cantharellus	cibarius var. amethysteus	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
5	Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
Total 61 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



*Tricholoma batschii*  
Fastberingter Ritterling

Oberhaut glatt oder trocknend seidig-faserig. Ziemlich fleischige Art mit einem anfangs +/- bauchigen Stiel. Zur Stielbasis hin unter der Haut gelblich gefärbt. Sp. 5-5,5x4-5 µm. Fleisch deutlich bitter. Gemischte Nadelwälder:



# Tricholoma auratum (aestuans) Weissfleischiger Grünling

Hut +/- schleimig, Scheibe kupferfarbig oder orange mit angedrückten Schüppchen, Rand zitronenfarbig oder blaß-, schwefelgelb. Fleisch weiß oder zur Peripherie hin blaßgelb. Stiel kurz und gedrungen (5-9 x 1-3 cm). Geruch pilzartig, schwach mehlig, banal. Sandige Kiefernwälder. (Oft auch mit *T. equestre* synonymisiert).



# Pilze der Woche 43

Gattung	Art	Autor	
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1 Xerocomus	parasiticus	(Bulliard: Fries) Quélet	Parasitischer Röhrling
2 Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2 Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2 Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
2 Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2 Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	pseudonapus	Hry. ap. Mos.	Fuchsighütiger Schleimkopfs
2 Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	fraudans	Kühn.	Umberbrauner Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lepista	graveolens	(Peck dermek	Starkkriechender Rötelritterling
2 Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2 Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2 Macrocytidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2 Melanoleuca	verrucipes	(Fr.) Singer	Rauhstiell-Weichritterling
2 Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2 Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2 Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2 Tricholoma	equestre	(L.: Fr.) Kumm.	Grünling
2 Tricholoma	orirubens		
2 Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
2 Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	deliciosus	(L.: Fr.) Gray	Edelreizker
3 Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3 Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



# Pilze der Woche 43

3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling	1 Boletales
3 Lactarius	subdulcis	(Pers.:Fr.) Gray	Süßlicher Buchen-Milchling	2 Agaricales
3 Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling	3 Russulales
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling	4 Aphylophorales
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling	5 Gastromycetes
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieler Ledertäubling	6 Heterobasidiomycetes
7 Hypoxylon	multiforme	(Willd. Ex Fr.) Dharne	Vielgestaltige Kohlenbeere	7 Ascomycetes
Total 43 Arten				



# *Cortinarius atrovirens*

## Schwarzgrüner Klumpfuss

Hutgrösse bis 80 mm. Lamellen und Stiel jung lebhaft gelb.  
Geruch pfefferartig. KOH unbedeutend.  
Sporen 9,5–11,5x5,5–6,5 µm, mandel- bis zitronenförmig.  
Nadelbäume (Weisstanne).



# Lepista luscida Marmorierter Rötelritterling

Geruch mehlartig, nicht parfümiert wie die Nebelkappe. Geschmack leicht mehlartig, mild, dumpf. Hut 2-8 (11) cm, graubraun mit konzentrischen Wasserflecken, Rand wellig, verbogen, meist auch hochgebogen, faserig. Fleisch weißlich, im Alter hell bräunlich. Stiel 2-8 (10) cm lang, 1-2 (3,5) cm dick, weißlich, graubraun, faserig, im Alter auch hohl werdend. Lamellen weißlich, später cremerosa, graurosa, etwas herablaufend, vor dem Stiel kaum ausgebuchtet, leicht ablösbar. Sporen pulverfarbe rosabraun ( $4,5-6,5 \times 5-4 \mu\text{m}$ , warzig). Vorkommen Parks, Wiesen, Waldränder, Waldwege, Folgezersetzer, Spätsommer bis Spätherbst.



# *Cortinarius pseudonapus* Fuchsighütiger Klumpfuss

Hut bis 120 mm, jung ockergelbbraun, Velumflocken schorfig. Fleisch weiss. Geruch und Geschmack unbedeutend, mild. KOH-Reaktion auf Huthaut rosabraun. Sporen 9,5–11,5x5,5–6,5, mandelförmig, warzig. Die Sporen sind deutlich kleiner als bei *C. napus*. Nadelbäume.



# Pilze ab Woche 44 bis 52

Gattung	Art	Autor	
2 Camarophyllus	pratensis	(Pers.: Fries) Kumm.	Wiesen-Ellerling
2 Clitocybe	vibecina	(Fr.:Fr.) Quél.	Weicher Trichterling
2 Coprinus	picaceus	(Bull.: Fr.) Gray	Specht-Tintling
2 Cortinarius	viscidulus	Moser	Flockiger Dickfuss
2 Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2 Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2 Hygrophorus	lucorum	Kalchbr.	Lärchen-Schneckling
2 Lepiota	helveola	Bres.	Fleischrosa Schirmling
2 Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2 Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2 Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2 Omphalina	rickenii	Sing. ex Hora	Mauer-Nabeling
2 Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweisser Schüppling
2 Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2 Tricholoma	portentosum	(Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger Ritterling
3 Russula	torulosa	Bresadola	Gedrungener Täubling
7 Ascocoryne	cylindrium	(Tul.) Korf	Grossporiger Gallertbecher
Total 17 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphylophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



*Tricholoma columbetta*  
Seidiger Ritterling

Laubwälder. Hut bis 100 mm, schwach schmierig. Geruch schwach mehlartig. Stiel manchmal blau fleckend. Sp. 5-6x3,5-4,5 µm. Ohne Schnallen.



# Mycena aetites

## Graublättriger Russ-Helmling

Hut 1-2,5 (3,5) cm , grau, graubraun, rußbraun, graublau, trocken braungrau, flach gebuckelt, halbkugelig, stark hygrophan, feucht leicht schmierig, Mitte +/- mit Papille, Rand weißlich, durchscheinend bis zum Scheitel gerieft. Fleisch weißlich, hellbraun, im Stiel graubraun, im Hut weiß, dünn. Stiel 2-4,5 (5,5) cm lang, 1-2 (3,5) mm dick, grau bis graubraun, etwas violettgrau überhaucht, brüchig, glatt, Spitze heller grau. Basis weißlich, filzig, nicht wurzelnd. Lamellen grau, graulila, gegabelt, schmal angeheftet, Schneiden heller, weißlich, zum Rand verschmälert, mäßig entfernt stehend. Sporen pulverfarbe weiß ( $6,5-11 \times 3,5-6,5 \mu\text{m}$ , ellipsoid, sehr variabel, Cheilo- und Pleurozystiden bauchig und apikal schnabelig verlängert,  $25-5 \times 6,5-28 \mu\text{m}$ , viersporig, Schnallen vorhanden, Zellen der Stielrinde stachelig-verzweigt. Vorkommen Weiden, Wiesen, Parks, grasbewachsene Flächen, zerstreut, Folgezersetzer, Sommer bis Herbst.



## *Ascocoryne cylindrium* Großsporiger Gallertbecher

Fruchtkörper 0,3-1,8 (2) cm Ø, rötlich, rosaviolett, violett, kugelig, becher- oder schüsselförmig, Außenseite kahl, blassrötlich und glatt, dick gallertartig, trocken hart. Rand häufig gelappt. Jung sind sie gestielt und wachsen oft in mehreren Büscheln zusammen. Auch zu größeren Gruppen zusammenließend. Deswegen unterscheiden sie sich von der Nebenfruchtform (ANAMORPHE); mit dem Fleischroten Gallertbecher. Fleisch durchsichtig, rötlich, gallertartig. Sporen pulverfarbe Hell, farblos, weißlich ( $17,5-33,5 \times 4-5,6 \mu\text{m}$ , ellipsoid spindelförmig, glatt, meist mit zwei Öltropfen, reif septiert, Asci  $155-220 \times 6-15 \mu\text{m}$ , achtsporig. Vorkommen auf Holz.



## *Hygrophorus lucorum* Lärchen-Schneckling

Hut 1-5 (6) cm, gelblich-orangegelblich, zitronengelb, schwach gebuckelt, Mitte dunkler orangegelb, etwas klebrig, schleimig, später leicht trichterförmig, Rand alt stark aufgebogen. Fleisch weißlich-hellgelblich, faserig. Stiel gelblich, weißlich-hellgelblich, meist hell beflockt, jung schleimig, längsfaserig, Spitze bereift, voll, alt hohl. Lamellen hellgelblich, alt glibbend, angewachsen, teils etwas herablaufend, dick, ähnlich dem Pfifferling. Sporenpulverfarbe weiß ( $6-9 \times 4-5 \mu\text{m}$ ). Vorkommen Lärche, +/- auch bei Kiefern, Symbiosepilz, Sommer bis Spätherbst, gern in Verbindung mit dem Goldröhrling.



# Alle Pilzfunde 2021

Gattung	Art	Autor	Name botanisch	
1	Boletus aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz	<a href="#">1 Boletales</a>
1	Boletus erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz	<a href="#">2 Agaricales</a>
1	Boletus luridus	Schäffer:	Fr. Netzstieler Hexen-Röhrling	<a href="#">3 Russulales</a>
1	Leccinum carpini	Hainbuchen-Rauhfuss		<a href="#">4 Aphylophorales</a>
1	Leccinum nigricans	(Richon & Roze) Sing.	Schwärzender Rauhfuss	<a href="#">5 Gastromycetes</a>
1	Boletus aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz	<a href="#">6 Heterobasidiomycetes</a>
1	Boletus calopus	Fr.	Schönfuss-Röhrling	<a href="#">7 Ascomycetes</a>
1	Boletus edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz	
1	Boletus erythropus	Flockenstieler Hexenröhrling		
1	Boletus radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling	
1	Chalciporus piperatus	(Bulliard: Fr.) Bataille	Pfeffer-Röhrling	
1	Chroogomphus rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss	
1	Gomphidius glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul	
1	Gyroporus cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling	
1	Hygrophoropsis aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling	
1	Leccinum carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss	
1	Omphalotus illudens	(Schw.) Sacc.	Leuchtender Ölbaumpilz	
1	Paxillus atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling	
1	Paxillus filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling	
1	Paxillus involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling	
1	Phylloporus pelletieri	(Lév.) Quél.	Goldblatt	
1	Porphyrellus porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling	
1	Strobilomyces strobilaceus	(Scop.: Fr.) Fr.Berk.	Strubelkopfröhrling	
1	Suillus granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling	
1	Suillus grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling	
1	Suillus luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz	
1	Suillus viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling	
1	Tylopilus felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling	
1	Xerocomus ferrugineus	Braunhütiger Filzröhrling		
1	Xerocomus badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling	
1	Xerocomus chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling	
1	Xerocomus communis, engeli	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling	
1	Xerocomus parasiticus	(Bulliard: Fries)	Quélet Parasitischer Röhrling	
1	Xerocomus porosporus	(Imler ex Romero et Bon)	Contu Düsterer Rotfuss-Filzröhrling	
1	Xerocomus pruinatus	(Fr.) Quél.	Stattlicher Rotfuss-Röhrling	
1	Xerocomus subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe	
2	Gymnopus dryophilus	Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling	
2	Gymnopus fusipes	Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling	
2	Gymnopus peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling	
2	Hydropus subalpinus	(Höhn)	Singer Buchenwald-Wasserfuss	
2	Marasmiellus ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindling	
2	Marasmius rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling	
2	Mycena abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling	

Arten in grüner Schrift sind  
eher selten



# Alle Pilzfunde 2021

2 Agaricus aestivalis (Moll.) Pil. Sommer-Egerling  
2 Agaricus augustus Fr. Braunschuppiger Riesenegerling  
2 Agaricus bitorquis (Quélét) Sacc. Trottoir-Champignon  
2 Agaricus campester Fr.: Fr. Wiesen-Champignon  
2 Agaricus essettei Bon Schieknölliger Anis-Champignon  
2 Agaricus langei (Moll.) Möhll. Grosssporiger Blutchampignon  
2 Agaricus silvaticus Schäff.: Fr. Echter Wald-Champignon  
2 Agaricus xanthoderma Genev. Karbol-Egerling  
2 Agrocybe erebia (Fr.) Kühn. Leberbrauner Ackerling  
2 Agrocybe praecox (Pers: Fr.) Fayod. Voreilender Ackerling  
2 Agrocybe semiorbicularis (Bull.: St. Am.) Fay. Halbkugeliger Ackerling  
2 Agrocybe vervaerti (Fr.) Sing. Hohlstieliger Ackerling  
2 Amanita battarrae (Boud.) Bon Zweifarbiger Streifling  
2 Amanita ceciliae Berkeley et Broome) Bas Riesen-Streifling  
2 Amanita citrina (Schäff.) Pers. Gelber Knollenblätterpilz  
2 Amanita excelsa (Fr.) Bertillon Grauer Wulstling  
**2 Amanita franchetii (Boud.) Fay. Rauher Wulstling**  
2 Amanita fulva (Schäffer) Fr. Rotbrauner Streifling  
2 Amanita mairei Foley Silbergrauer Scheidenstreifling  
2 Amanita muscaria (L.) Hook. Fliegenpilz  
2 Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. Pantherpilz  
2 Amanita phalloides (Fr.) Link Grüner Knollenblätterpilz  
2 Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr. Porphyrbrauner Wulstling  
2 Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Gray Perlplätzchen  
2 Amanita umbrinolutea Secr.: Gill.) Bat.) Verfärbender Scheidenstreifling  
2 Amanita vaginata (Bulliard) Vittadini Grauer Streifling  
2 Armillaria borealis Marxm. & Korth. Nordischer Hallimasch  
2 Armillaria ostoyae Romagn. Dunkler Hallimasch  
2 Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. Gold-Mistpilz  
2 Calocybe chrysenteron (Bull.: Fr.) Sing.: Bon Dottergelber Schönkopf  
2 Calocybe gambosa (Fr.) Donk Mairitterling  
2 Camarophyllum pratensis (Pers.: Fries) Kumm. Wiesen-Ellerling  
2 Camarophyllum russocoriaceus (Berk. & Miller) Lange Juchten-Ellerling  
2 Cerrena unicolor Aschgrauer Langporenporig  
**2 Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk Fleckender Schmierschirmling**  
2 Clitocybe clavipes (Pers.) Kumm. Keulenfuss-Trichterling  
2 Clitocybe foetens Melot Stinkender Trichterling  
2 Clitocybe fragrans (With.) Kumm. Dufttrichterling  
2 Clitocybe geotropa (DC. & Lam) Quél. Mönchskopf  
2 Clitocybe gibba (Pers. Fr.) Kummer Ockerbrauner Trichterling  
2 Clitocybe nebularis (Batsch. Fries) Kummer Nebelgrauer Trichterling  
2 Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm. Grüner Anistrichterling  
2 Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kp. Ranziger Trichterling  
2 Clitocybe phyllophila (Pers.) Kumm. Bleiweisser Trichterling

- 1 Boletales**
- 2 Agaricales**
- 3 Russulales**
- 4 Aphyllophorales**
- 5 Gastromycetes**
- 6 Heterobasidiomycetes**
- 7 Ascomycetes**



# Alle Pilzfunde 2021

2 Clitocybe vibecina (Fr.:Fr.) Quél. Weicher Trichterling  
2 Clitocybula lacerata (Scropoli) Métrod Fransiger Faserrübling  
2 Clitopilus prunulus (Scop. Fr.) Kumm. Mehrlässling  
2 Conocybe lactea (Lange) Métrod Milchweisses Samthäubchen  
2 Conocybe semiglobata Kühn. & Watl. Halbkugeliges Samthäubchen  
2 Coprinus atramentarius (Bulliard: Fr.) Fr. Grauer Faltentintling  
2 Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers. Schopf-Tintling  
2 Coprinus domesticus (Bolt.y: Fr.) Gra Haus-Tintling  
2 Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. Glimmertintling  
2 Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray Specht-Tintling  
2 Coprinus radicans Desm. Rötlicher Filztintling  
2 Cortinarius amurceus (subtortus) (Pers.: Fr.) Fr. Ockergelber Schleimkopf  
2 Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr. Braunvioletter Dickfuss  
2 Cortinarius arquatus Silbriger Dickfuss  
2 Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr. Rotschuppiger Rauhkopf  
2 Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. Dunkelbrauner Gürtelfuss  
2 Cortinarius caerulescens (Schäff.) Fr. Blauer Klumpfuss  
2 Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. Bocks-Dickfuss  
2 Cortinarius cotoneus Fr. Olivbrauner Rauhkopf  
2 Cortinarius cyaneus (Bres.) Mos. Blauer Schleimkopf  
2 Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. Strohgelber Klumpfuss  
2 Cortinarius epipoleus Fr. Stahlgrauer Kleinspor-Schleimfuss  
2 Cortinarius flexipes (Pers.: Fr.) Fr. Duftender Gürtelfuss  
2 Cortinarius gentilis Goldgelber Rauhkopf  
2 Cortinarius hinnuleus Fr. Erdgriechender Gürtelfuss  
2 Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr. Bitterer Schleimfuss  
2 Cortinarius largus Fr. Blasser Schleimkopf  
**2 Cortinarius melanotus Kalchbr. Braunnetziger Rauhkopf**  
2 Cortinarius mussivus (Fr.) Melot Stinkender Schleimkopf  
2 Cortinarius nanceiensis Mr. Gelbflockiger Schleimkopf  
2 Cortinarius nemorensis (Fr.) Lge. Verfärbender Schleimkopf  
2 Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. non ss. Hry Jodoform-Wasserkopf  
2 Cortinarius odorifer Britz Anis-Klumpfuss  
2 Cortinarius olidus Lge. Gelbgürtelter Schleimkopf  
2 Cortinarius orellanus (Fr.) Fr. Orangefuchsiger Rauhkopf  
2 Cortinarius praestans (Cord.) Gill. Schleiereule  
2 Cortinarius pseudonapus Hry. ap. Mos. Fuchsighütiger Schleimkopfs  
2 Cortinarius purpurascens Fr. Purpurfleckender Klumpfuss  
2 Cortinarius rubellus Cooke Spitzgebuckelter Rauhkopf  
2 Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears. Rötlichfaseriger Rauhkopf  
2 Cortinarius sanguineus Blutroter Hautkopf  
2 Cortinarius saturninus Fr. Blaufleischiger Gürtelfuss  
2 Cortinarius scaurus (Fr.: Fr.) Fr. Olivblättriger Klumpfuss  
2 Cortinarius semisanguineus (Fr.) Blutblättriger Hautkopf

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphyllophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



# Alle Pilzfunde 2021

2 *Cortinarius sommerfeltii* Høiland Orangeblättriger Hautkopf  
2 *Cortinarius stillatus* Fr. Honig-Schleimfuss  
2 *Cortinarius torvus* (Bull.: Fr.) Fr. Wohlriechender Gürtelfuss  
2 *Cortinarius traganus* Fr. Lila-Dickfuss  
2 *Cortinarius variecolor* (Pers.: Fr.) Fr. Erdigriechender Schleimkopf  
2 *Cortinarius varius* Fr. Ziegelgelber Schleimkopf  
2 *Cortinarius venetus* (Fr.). Fr. Grüner Buchenwald-Rauhkopf  
2 *Cortinarius violaceus* (L.:Fr.) Fr. Dunkelvioletter Schleierling  
2 *Cortinarius viscidulus* Flockiger Dickfuss  
2 *Crepidotus applanatus* Pers. Kummer Geriefetes Stummefüßchen  
2 *Crepidotus mollis* (Schäff.L Fr.) Staude Gallertfleischiges Stummelfüßchen  
2 *Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) Kummer Gemeines Stummelfüßchen  
2 *Cystoderma amiantinum* (Scop.: Fr.) Fayod Amiant-Körnchenschirmling  
2 *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon Spitzschuppiger Schirmling  
2 *Entoloma plebejum* (Kalchbr.) Noord. Voreilender Rötling  
2 *Entoloma rhodopolium* var. *nidorosum* (Fr.)Nordel./Kumm. Alkalischer Rötling  
2 *Entoloma sericeoides* (Lge.) Noord. Seidenartiger-Rötling  
2 *Entoloma sinatum* (Buillar Fr.) Kummer Riesen-Rötling  
2 *Entoloma vernum* Lundell Frühlingsrötling  
2 *Galerina marginata* (Batsch) Kühn. Gifthäubling  
2 *Flammulina velutipes* (Curtis.:Fr.) Singer Samtfussrübling  
2 *Galerina marginata* (Batsch) Kühn. Gifthäubling  
2 *Galerina stylifera* Corb.-Heim. Behangener Häubling  
2 *Gymnopilus penetrans* (Pers.: Fr.) Murrill Geflecktblättriger Flämmling  
2 *Gymnopus acervatus* (Fr.) Murrill Büscheliger Blasssporrübling  
2 *Gymnopus aquosa* (Bull.: Fr.) Kumm. Wässriger Rübling  
2 *Gymnopus confluens* (Pers.: Fr.) Kumm. Knopfstieliger Rübling  
2 *Gymnopus dryophilus* (Bulliard: Fr.) Murrill Waldfreund-Rübling  
2 *Gymnopus fusipes* (Bull.: Fr.) Quél. Spindeliger Rübling  
2 *Gymnopus peronata* (Bolt.: Fr.) Kumm. Brennender Rübling  
2 *Hebeloma birrum* Fr. ss. Mos. Spindelfüssiger Fälbling  
2 *Hebeloma sinapizans* (Paul.: Fr.) Gill. Rettich-Fälbling  
2 *Hebeloma theobrominum* Kakaofälbling  
2 *Hohenbuhelia geogenia* (DC.: Fr.) Sing. Trichterförmiger Muscheling  
2 *Hydropus subalpinus* (Höhn) Singer Buchenwald-Wasserfuss  
2 *Hygrocybe psittacina* (Schäff.: Fr.) Wünsche Papageigrüner Saftling  
2 *Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. Wohlriechender Schneckling  
2 *Hygrophorus arbustivus* (Fr.) Fr. Faserhütiger Schneckling  
2 *Hygrophorus cossus* (discoxanthus) (Sow. ex Fr.) Fr. Verfärbender Schneckling  
2 *Hygrophorus discoideus* (Pers.: Fr.) Fr. Braunscheibiger Schneckling  
2 *Hygrophorus latitabundus* Britz. Grauweisser Schneckling  
2 *Hygrophorus lucorum* Kalchbr. Lärchen-Schneckling  
2 *Hygrophorus nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr. Hain-Schneckling  
2 *Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr. Orange-Schneckling

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphyllophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



# Alle Pilzfunde 2021

2 *Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) Kummer Rauchblättriger Schwefelkopf  
2 *Hypholoma fasciculare* (Huds.:Fr.) Kumm. Grünblättriger Schwefelkopf  
2 *Hypholoma radicosum* E.Lange Wurzelnder Schwefelkopf  
2 *Inocybe asterospora* Quélet Sternsporiger Risspilz  
2 *Inocybe adequata* (Britz.) Sacc. Weinrötlicher Risspilz  
2 *Inocybe assimilata* (Britz.) Sacc. Rundknölliger Risspilz  
2 *Inocybe bongardii* (Weinmann) Quélet Duftender Risspilz  
2 *Inocybe cervicolor* (Pers.) Quél. Hirschbrauner Risspilz  
2 *Inocybe cookei* Bres. Knölliger Risspilz  
2 *Inocybe corydalina* Quélet Grüngelblicher Risspilz  
**2 *Inocybe flavella* P. Karst. Weisscheiteliger Risspilz**  
2 *Inocybe fraudans* Kühn. Umberbrauner Risspilz  
2 *Inocybe fuscidula* Vel. Braunstreifiger Risspilz  
2 *Inocybe geophylla* (Sow.: Fr.) Kumm. Erdblättriger Risspilz  
2 *Inocybe hirtella* var. *bispora* Kuy. Zweisporiger Bittermandel-Risspilz  
2 *Inocybe nitiduscula* (Britz.) Sacc. Früher Risspilz  
2 *Inocybe phaeodisca* Kühn. Braunscheibiger Risspilz  
2 *Inocybe pusio* Karst. Radialrissiger Risspilz  
2 *Inocybe queletii* Maire et Konr. Weisstannen-Risspilz  
2 *Inocybe rimosa* (Cke.) Kuyp. Kegeliger Risspilz var.  
2 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kuyp. Schuppenstieler Risspilz  
2 *Kuehneromyces mutabilis* (Scopp.: Fr.) Sg. & Sm. Gemeines Stockschwämmchen  
2 *Laccaria amethystea* (Bull.) Murrill Violetter Lacktrichterling  
2 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Br. Rötlicher Lacktrichterling  
2 *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.: Fr.) Pat. Tränender Saumpilz var.  
2 *Lacrymaria pyrrhotricha* (Holmsk.) Feuerfarbener\_Saumpilz  
2 *Lentinellus ursinus* (Fr.) Kühn. Filziger Zähling  
2 *Lentinus adhaerens* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. Harziger Sägeblättling  
2 *Lentinus torulosus* (Pers.: Fr. Lloyd Laubholz-Knäueling  
2 *Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) Kumm. Wolligstieliger Schirmling  
2 *Lepiota cristata* (Bolton.: Fr.) Kummer Stink-Schirmling  
2 *Lepiota felina* (Pers.: Fr.) Karst. Katzen-Schirmling  
**2 *Lepiota helveola* Bres. Fleischrosa Schirmling**  
2 *Lepiota subgracilis* Kühn. Schüppchen-Schirmling  
2 *Lepiota ventriospora* Reid Gelbwolliger Schirmling  
2 *Lepista densifolia* (Favre) Sing. Dichtblättriger Rötelritterling  
2 *Lepista flaccida* (Sowerby Fries) Patouillard Fuchsiger Rötelritterling  
2 *Lepista graveolens* (Peck dermek Starkriechender Rötelritterling  
2 *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke Violetter Rötelritterling  
2 *Lepista panaeolus* (Fr.) Karst. Horngrauer Rötelritterling  
2 *Lepista splendens* (Pers.: Fr.) Konrad. Wasserfleckiger Rötelritterling  
2 *Leucocortinarius bulbiger* (A. & S.: Fr.) Sing. Knölliger Schleierritterling  
2 *Leucopaxillus candidus* Singer Kleiner Riesen-Krempestrichterling  
2 *Limacella glioderma* (Fr.) Konr. & Maulb. Schmieriger Schleimschirmling

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphyllophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



# Alle Pilzfunde 2021

- 2 *Lyophyllum boudieri* Kühn. & Romagn. Russbraunes Graublatt  
2 *Lyophyllum connatum* (Schum.: Fr.) Sing. Weisser Büschelrasling  
2 *Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer Brauner Büschelrasling  
2 *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühn. Gepanzerter Rasling  
**2 *Lyophyllum paenichroum* Clmç. Lemfarbener Schwärzling**  
**2 *Lyophyllum rhopalopodium* Clmç. Derbknölliger Rasling**  
2 *Macrocystidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss. Gurkenschnitzling  
2 *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr. Sg. Parasol  
2 *Macrolepiota rachodes* var. *rachodes* Safran-Riesenschirmling  
2 *Marasmiellus ramealis* (Bull.: Fr.) Sing. Ästchenschwindling  
2 *Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr. Langstieler Knoblauchschwindling  
2 *Marasmius bulliardii* Quél. Noordel. Nadelstreu-Käsepilzchen  
2 *Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Fr. Hornstieler Schwindling  
2 *Marasmius oreades* (Bolton.: Fr.) Fr. Nelkenschwindling  
2 *Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr. Halsbandschwindling  
2 *Marasmius torquescens* Quél. Ledergelber Schwindling  
2 *Marasmius winnei* Berk & Br. Violettlicher Schwindling  
2 *Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar Gemeines Breitblatt  
2 *Melanoleuca verrucipes* (Fr.) Singer Rauhstieler Weichritterling  
2 *Meripilus giganteus* (Pers.: Fr.) Gemeiner Riesenporling  
2 *Mycena polygramma* fo. *pumila* J.E. Lange Rillstieler Helmling (kleine form)  
2 *Mycena abramsii* (Murr.) Murr. Voreilender Helmling  
2 *Mycena aetites* (Fr.) Quélet Graublättriger Russ-Helmling  
2 *Mycena capillaris* Peck Haarstieler Helmling  
2 *Mycena crocata* (Schrader: Fr.) Kummer Gelborangemilchendeter Helmling  
2 *Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gray Dehnbarer Helmling  
2 *Mycena filopes* (Bull.: Fr.) Kumm. Zerbrechlicher Fadenhelmling  
2 *Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray Rosablättriger Helmling  
2 *Mycena inclinata* (Fr.) Quél. Buntstieler Helmling  
2 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél. Schwarzgezähnelter Helmling  
2 *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Kumm. Rettich-Helmling  
2 *Mycena renati* Quélet Gelbstieler Nitrat-Helmling  
2 *Mycena rosea* (Bull.) Gramberg Rosa-Rettichhelmling  
2 *Mycena zephyrus* (Fr.: Fr.) Kumm. Rostfleckiger Helmling  
**2 *Nyctalis asterophora* Fr. Stäubender Zwitterling**  
**2 *Omphalina rickenii* Sing. ex Hora Mauer-Nabeling**  
2 *Oudemansiella mucida* (Schrad. ex Fr.) v.H. Beringer Schleimrübling  
2 *Panaeolus fimicola* (Fr.) Gill. Mist-Düngerling  
2 *Panellus stypticus* (Bull.: Fr.) P.Karst. Bitterer Muschelseitling  
2 *Phaeolepiota aurea* (Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl. Goldfarbener Glimmerschüppling  
2 *Pholiota adiposa* (Fr.) Kumm. Schleimiger Schüppling  
2 *Pholiota flammans* (Fr.:) Kummer Feuerschüppling  
2 *Pholiota graminis* (Quél.) Sing. Gras-Schüppling  
2 *Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer Tonweisser Schüppling

- 1 Boletales  
2 Agaricales  
3 Russulales  
4 Aphyllophorales  
5 Gastromycetes  
6 Heterobasidiomycetes  
7 Ascomycetes



# Alle Pilzfunde 2021

- 2 *Pholiota populnea* (Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall. Pappel-Schüppling  
2 *Pholiota squarrosa* (Pers.: Fr.) Kumm. Sparriger Schüppling  
2 *Pleurotus pulmonarius* Quelet Lungen-Seitling  
2 *Pluteus atromarginatus* (Sing.) Kühn. Schwarzschniediger Dachpilz  
2 *Pluteus cervinus* Rehbrauner Dachpilz  
2 *Pluteus leonius* (Schäff.: Fr.) Kumm. Löwengelber Dachpilz  
2 *Pluteus nanus* (Pers.: Fr.) Kumm. Zwerg-Dachpilz  
2 *Pluteus petasatus* (Fr.) Gill Seidiger Dachpilz  
2 *Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) Kumm. Grauer Dachpilz  
2 *Psathyrella cadolleana* (Fr.: Fr.) Maire Behangener Faserling  
2 *Psathyrella piluliformis* (Bull.: Fr.) Ort. Wässriger Faserling  
2 *Psathyrella prona* (Fr.) Gill. Gemeinder Wegzärtling  
2 *Psathyrella pseudogracilis* (Romagn.) Mos. Zierlicher Faserling  
2 *Psathyrella spadiceogrisea* (Schäff.) Fr. Maire Dungbewohnender Faserling  
2 *Psilocybe rhombispora* Rautensporiger Kahlkopf  
2 *Rhodocollybia butyracea* (Bull.: Fr.) Lenn. Butter Rosasperrübling  
2 *Rhodocollybia maculata* (Alb. et Schw. Fr.) Gefleckter Rübling  
2 *Rhodocybe nitellina* (Fr.) Sing. Gelbfuchsiger Tellerling  
2 *Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raith. Orangegegelber Heftelnabeling  
2 *Ripartites tricholoma* (Alb. & v. Schw.) Bewimperter Filzkrempling  
2 *Rozites caperatus* (Pers.: Fr.) P. Karst. Zigeunerpilz  
2 *Schizophyllum commune* Fr.: Fr. Gemeiner Spaltblättling  
2 *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr) Sg. Fichtenzapfenrübling  
2 *Stropharia caerulea* Kreisel Blauer Träuschling  
2 *Stropharia semiglobata* (Batsch.: Fr.) Quél. Halbkugeliger Träuschling  
2 *Tricholoma atrosquamosum* (Chev.) Sacc. Schwarzschnuppiger Ritterling  
2 *Tricholoma basirubens* Bon Rosafüssiger Ritterling  
2 *Tricholoma batschii* Gulden ex Christ. et Noordeloons Fastberingter Ritterling  
2 *Tricholoma columbetta* (Fr.) Kumm. Seidiger Ritterling  
2 *Tricholoma equestre* (L.: Fr.) Kumm. Grünling  
2 *Tricholoma fulvum* (DC.: Fr.) Sacc. Gelbbältiger Ritterling  
2 *Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) Kumm. Feinschuppiger Ritterling  
2 *Tricholoma inamoenum* (Fr.) Gillet Lästiger Ritterling  
2 *Tricholoma lascivum* (Fr.) Gill. ss. Lge. Unverschämter Ritterling  
2 *Tricholoma luridum* (Schäff.: Fr.) Quél. Graubältiger Ritterling  
2 *Tricholoma myomyces* (Pers.: Fr.) Lge. Maus-Ritterling  
2 *Tricholoma orirubens* Rötender Erdritterling  
2 *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél. Schwarzfaseriger Ritterling  
2 *Tricholoma pseudonicticans* Bon Blassfleischiger Fichtenritterling  
2 *Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kumm. Seifen-Ritterling  
2 *Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél. Gilbender Erd-Ritterlig  
2 *Tricholoma sciodes* (Secr.) Martin Schärflicher Ritterling  
2 *Tricholoma sejunctum* (Sow.: Fr.) Quél. Grüngelber Ritterling  
2 *Tricholoma stans* (Fr.) Sacc. Rostfleckender Kiefer-Ritterling

- 1 Boletales  
2 Agaricales  
3 Russulales  
4 Aphyllophorales  
5 Gastromycetes  
6 Heterobasidiomycetes  
7 Ascomycetes



# Alle Pilzfunde 2021

2 Tricholoma subsejunctum Grüngelber Ritterling (forma)  
2 Tricholoma sulfurescens Bres. Gelbweisser Ritterling  
2 Tricholoma sulfureum (Bull.: Fr.) Kumm. Schwefel-Ritterling  
2 Tricholoma terreum (Schäff.:) Fr.) Kumm. Erdritterling  
2 Tricholoma umbonatum Lge. ex Clç. & Bon Buckliger Ritterling  
2 Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kumm. Brandiger Ritterling  
2 Tricholoma ustaloides Romagn. Bitterer Eichenritterling  
2 Tricholoma vaccinum (Pers.: Fr.) Kumm. Zottiger Ritterling  
2 Tricholomopsis decora (Fr.) Sing. Olivgelber Holzritterling  
2 Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer Purpurfilziger Holzritterling  
2 Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon Winter-Trompetenschnitzling  
2 Volvariella murinella (Quél.) Mos. Mausgrauer Scheidling  
2 Xerula melanotricha Dörfelt Weisstannen-Wurzelrübling  
2 Xerula radicata (Relhan.: Fr.) Dörfelt Wurzel-Schleimrübling  
3 Lactarius cremor (rustratus) Fr. Runzliger Zergmilchling  
3 Lactarius acerrimus Britz. Queradriger Milchling  
3 Lactarius acris (Bolt.: Fr.) Gray Rosaanlaufender Milchling  
3 Lactarius azonites (Bull.) Fr. Rauchfarbener Rosamilchling  
3 Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. Graugrüner Milchling  
3 Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. Kamfermilchling  
3 Lactarius cremor (rustratus) Fr. Runzliger Zergmilchling  
3 Lactarius deliciosus (L.): Fr.) Gray Edelreizker  
3 Lactarius deterrimus Gröger Fichtenreizker  
**3 Lactarius flavidus Boud. Hellgelber Violetermilchling**  
3 Lactarius glaucescens Crossl. Grünender Pfeffermilchling  
3 Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr. Blasser Duftmilchling  
3 Lactarius hepaticus Plowrhigt Leberbrauner Milchling  
3 Lactarius hortensis Velen Haselmilchling  
3 Lactarius luridus (Pers.: Fr.) Gray Gewöhnlicher Violetermilchling  
3 Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr. Falber Milchling  
3 Lactarius picinus Fr. Pechschwarzer Milchling  
3 Lactarius piperatus (L. Fr.) Gray Pfeffermilchling  
3 Lactarius pterosporus Romagnesi Flügelsporiger Milchling  
3 Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr. Scharfer Hasel-Milchling  
3 Lactarius quietus (Fr.) Fr. Eichenmilchling  
3 Lactarius romagnesii Bon Kerbrandiger Korallenmilchling  
3 lactarius rufus (Scopoli: Fr.) Fr. Rotbrauner Milchling  
3 Lactarius salmonicolor Helm & Lecl. Lachsreizker  
3 Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. Grubiger Fichtenmilchling  
3 Lactarius serifluus (De Candollo: Fr.) Fr. Wässriger Milchling  
3 Lactarius subdulcis (Pers.: Fr.) Gray Süßlicher Buchen-Milchling  
3 Lactarius tabidus Fr. (non ss. Boud.Neuh) Flattermilchling  
3 Lactarius volemus (Fr.: Fr.) Fr. Brätling  
3 Lactarius zonaroides Kühner et Romagn. Montaner Zonen-Milchling

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphyllophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



# Alle Pilzfunde 2021

3 Russula adulterina Fr. ss. Rom. Scharfer Brauntäubling  
3 Russula amethystina Quélet Amethysttäubling  
3 Russula atropurpurea (Krombh.) Britz. Pupurschwarzer Täubling  
3 Russula badia Quél. Zedernholztäubling  
3 Russula caerulea (Pers.: Fr.) Buckeltäubling  
3 Russula carpini Gir. & Hein. Hainbuchentäubling  
3 Russula cavipes Britz. Weisstannentäubling  
**3 Russula claroflava Grove Gelber Graustieltäubling**  
3 Russula cyanoxantha Frauentäubling  
3 Russula cyanoxantha fo. pelter. R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling  
3 Russula decolorans (Fr.) Fr. Orangeroter Graustieltäubling  
3 Russula delica Fr. Gemeiner Weisstäubling  
3 Russula densifolia Gill. Dichtblättriger Schwärztäubling  
3 Russula emetica (Schäff.: Fr.) Gray Kirschröter Speitläubling  
3 Russula faginea Romagnesi Buchen-Heringstäubling  
3 Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. Gallentäubling  
3 Russula foetens (Phillips in Berk. & Br.) Arn. Stinktäubling  
3 Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. Wechselfarbiger Speitläubling  
3 Russula grata (laurocerasi) Melzer Mandeltäubling  
3 Russula graveolens Romell Fleisschvioletter Heringstäubling  
3 Russula grisea Fr. Grauvioletter Reiftäubling  
3 Russula heterophylla (Fr.) Fr. Grüner Speisetäubling  
3 Russula illota Romagn. Morsetäubling  
3 Russula integra Britzelmayr Braunroter Ledertäubling  
3 Russula lepida Fr. Harter Zinnobertäubling  
3 Russula lutea (Huds.: Fr.) Gray Glänzengelber Dottertäubling  
3 Russula nauseosa (Pers.) Fr.. Geriefter Weichtäubling  
3 Russula nigricans (Bull.) Fr. Dickblättriger Schwärztäubling  
3 Russula ochroleuca (Pers.: Fr.) Ockertäubling  
3 Russula olivacea (Schäf.) Fr. Rotstieler Ledertäubling  
3 Russula olivascens (postiana) (Pers.: Fr.) Bres. Olivgrüner Täubling  
3 Russula pseudointegra Arn. & Gor. Ockerblättriger Zinnobertäubling  
3 Russula puellaris Fr. Milder Wachstäubling  
3 Russula queletii Fr. Stachelbeer-Täubling  
3 Russula romellii Maire Weissstieler Ledertäubling  
**3 Russula rubra (Lmck. Fr.) Fr. Scharfer Zinnobertäubling**  
**3 Russula sanguinea (Bull. ex St. Am.) Fr. Blutroter Täubling**  
**3 Russula sardonia Fr. Zitronenblättriger Täubling**  
3 Russula solaris Ferd. et Winge Sonnentäubling  
3 Russula torulosa Bresadola Gedrungener Täubling  
3 Russula velutipes (aurora) Velenovsky Rosa-Täubling  
3 Russula vesca Fr. Fleischroter Speisetäubling  
3 Russula virescens (Schäff.: Pers.:) Fr. Gefeldeter Grüntäubling  
3 Russula viscosa Kudrna Lederstieltäubling

- [1 Boletales](#)
- [2 Agaricales](#)
- [3 Russulales](#)
- [4 Aphyllophorales](#)
- [5 Gastromycetes](#)
- [6 Heterobasidiomycetes](#)
- [7 Ascomycetes](#)



# Alle Pilzfunde 2021

- 4 Meruliodipsis corium (Fr.) Ginns Lederartiger Fältling  
4 Abortiporus biennis (Bull.:Fr.) Sing. Rötender Saftwirrling  
4 Albatrellus ovinus (Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz. Schafporling  
4 Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Karst. Angebrannter Rauchporling  
4 Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod Grauer Russporling  
4 Cantharellus cibarius Fr. Eierschwamm  
4 Cantharellus melanoxeros Desm. Gelbvioletter Pfifferling  
4 Cantharellus tubaeformis Fr. Durchbohrter Leistling  
4 Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar Violetter Schichtpilz  
4 Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk Abgestutzte Herkuleskeule  
4 Clavulina cristata (Holmskj.: Fr.) Schröt. Kammförmige Koralle  
4 Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schröt. Runzlige Koralle  
4 Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. Nordischer Porling  
4 Coriolopsis trogii (Berk.) Doman. Blasse Borstentramete  
4 Craterellus cornucopioides Pers. Totentrompete  
4 Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich Ablösender Rindenpilz  
4 Daedalea quercina (L. ex Fr.) Eichenwirrling  
4 Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schröt. s. str. Rötende Tramete  
4 Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. Echter Zunderschwamm  
4 Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. Rotbrauner Baumschwamm  
4 Fomitopsis rosea (Albertini et Schweiniz: Fr.) Karsten Rosenroter Baumschwamm  
4 Ganoderma resinaceum Boud. in Pat. Harziger Lackporling  
4 Gleoporus dichrous (Fr.) Bres. Zweifarbiger Gallertporling  
4 Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imzyzki Fencheltramete  
4 Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray Klapperschwamm  
4 Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Karst. Zimtfarbener Weichporling  
4 Hydnus repandum L.: Fr. Semmel-Stoppelpilz  
4 Hydnus repandum var. rufescens (Fr.) Barla Rotgelber Stoppelpilz  
4 Hymenochaeta cruenta (Pers.: Fr.) Donk Blutroter Borstenscheibling  
4 Hymenochaeta rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. Rotbrauner Borstenscheibling  
4 Inonotus hispidus (Fr.) Karst. Zottiger Schillerporling  
4 Inonotus radiatus (Sow. ex Fr.) Karst. Erlen-Schillerporling  
4 Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. Milchweisser Eggenpilz  
4 Laetiporus sulfureus Murr. Schwefelporling  
4 Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst. Riesenporling  
4 Meruliodipsis corium (Fr.) Ginn Lederartiger Fältling Total 31 Arten  
4 Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv. Blauer Saftporling  
4 Phaeolus schweiniczii Kiefernbraunporling  
4 Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. Braune Borstentramete  
4 Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Rea Buchen-Aderzähling  
4 Polyporus badius (Pers.: Gray) v. Schw. Kastanienbrauern Porling  
4 Polyporus brumalis Pers.: Fr. Winterporling  
4 Polyporus ciliatus Fr. Bewimpelter Porling  
4 Polyporus leptcephalus (varius) Jacquin: Fr. Löwengelber Porling

- 1 Boletales  
2 Agaricales  
3 Russulales  
4 Aphyllophorales  
5 Gastromycetes  
6 Heterobasidiomycetes  
7 Ascomycetes



# Alle Pilzfunde 2021

- 4 Polyporus squamosus Fr. Schuppiger Porling  
4 Polyporus tuberaster (Jacq.: Pers.) Fr. Sklerotien-Porling  
4 Pseudocraterellus sinuosus (Fr.: Fr.) Reid. Krauser Leistling  
4 Pulcherricum (Tevana) caeruleum (Fr.) Parm. Blauer Rindenpilz  
4 Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Leuchtender Weichporling  
4 Ramaria flava (Schäff.: Fr.) Quél. Schwefelgebe Koralle  
4 Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quél. s. str. Steife Koralle  
4 Sarcodon (L.: Fr.) Karst. Habichtsstacheling  
4 Schizophyllum commune Fr.: Fr. Gemeiner Spaltblättling  
4 Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk Veränderlicher Spaltporling  
4 Steccherinum ochraceum (Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray Ockerrötlichr Resupinatstacheling  
4 Stereum subtomentosum Pouzar Samtiger Schichtpilz  
4 Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F. Gray Striegeliger Schichtpilz  
4 Stereum rameale (Pers.: Fr.) Burt Ästchen-Schichtpilz  
4 Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. Buckel-Tramete  
4 Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilát Striegelige Tramete  
4 Trametes multicolor (Schäff.) Jüл. Zonen-Tramete  
4 Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát Schmetterlings-Tramete  
4 Trichaptum abietinum (Fr.) Ryv. Tannentramete  
4 Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire Rindensprenger  
5 Geastrum sessile (Sow.) Pouz. Gewimperter Erdstern  
5 Geastrum triplex Jungh. Halskrausen-Erdstern  
5 Lycoperdon mammaeforme Pers. Flocken-Stäubling  
5 Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. Flaschen-Stäubling  
5 Lycoperdon pyriforme Schäff.: Pers. Birnen-Stäubling  
5 Phallus impudicus L. ex Pers. Stinkmorchel  
5 Scleroderma areolatum Ehrenb. Gefelderter Kartoffelbovist  
5 Scleroderma verrucosum (Bull:) ex Pers. Dünnschaliger Kartoffelhartbovist  
6 Auricularia auricula-judae (Bull. ex St. Am.) Wettst. Judasohr  
6 Auricularia mesenterica Dicks.: Fr. Gezonter Ohrlappenpilz  
6 Exidia truncata Fr.: Fr. Becherförmiger Drüsling  
6 Helveloid plana / glandulosa Fr. Hexenbutter  
6 Tremiscus helvelloides (DC: Pers.) Donk Roter Gallerttrichterling  
7 Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf Grosssporiger Gallertbecher  
7 Bisporella pallescens Pers.(Ex S.F. Gray) Carpenter & Korf Blasses Buchenbecherchen  
7 Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fries Stachelsporiger Mäandertrüffel  
7 Daldinia concentrica (Bolton: Fr.) Cesati et DeNotaris Konzentrischer Holzkohlenpilz  
7 Dasyscyphus virgineus S.F. Gray Weisses Haarbecherchen  
7 Disciotis venosa Fr. Morchelbecherling  
7 Gyromitra gigas (Schäff. ex Pers.) Quél. Riesenlorchel  
7 Helvella crispa (Scopoli: Fr.) Fr. Herbst-Lorchel  
7 Helvella leucomelas (Fr.) Fr. Schwarzweisser Rippenbecherling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



# Alle Pilzfunde 2021

- 7 *Helvella macropus* (Pers.: Fr.) Karsten Langfuss-Lorchel  
7 *Humaria hemisphaerica* (Berk. & Br.) Nannf. Halbkugeliger Borstenbecherling  
7 *Hypoxylon multiforme* (Willd. Ex Fr.) Dharne Vielgestaltige Kohlenbeere  
7 *Lachnellula subtilissima* (Cke.) Dennis Weisstannen-Haarbecherchen  
7 *Leotia lubrica* (Fr.) Karst. Gemeines Gallertkäppchen  
7 *Morchella gigas* (=semilibera) (Batsch:Fr.) Pers. Käppchen-Morchel  
7 *Nectria cinnabarinata*  
7 *Otidea concinna* (L.: Fr.) Fuckel Zitronengelber Öhring  
7 *Otidea onotica* (Pers.) Fuck. Eselsohr  
7 *Paxina acetabulum* (Pers.) O. Kutze Hochgerippter Becherling  
7 *Peziza arvernensis* Pers. Ex Mérat Buchenwaldbecherling  
7 *Peziza succosa* (Hedw.) Fr. Gelbmilchender Becherling  
7 *Sarcoscypha coccinea* (Beck ex Saccardo) Boudier Zinnoberroter Prachtsbecherling  
7 *Sarcosphaera crassa* Hedwig ex Fr.) Fuck. Kronenbecherling (Beatenberg)  
7 *Scutellinia scutellata* (Fuck.) Boud. Holz-Schildborstling  
7 *Tuber aestivum* (Fr.) Petrak Sommer-Trüffel  
7 *Ustulina deusta* Swartz ex Pers. Brandiger Krustenpilz  
7 *Xylaria hypoxylon* Nitschke Geweihförmige Holzkeule  
Total 501 verschiedene Arten

- 1 Boletales  
2 Agaricales  
3 Russulales  
4 Aphyllophorales  
5 Gastromycetes  
6 Heterobasidiomycetes  
7 Ascomycetes

